

N<sup>o</sup> 4.



# CATALOGUE GÉNÉRAL

DES VÉGÉTAUX DE SERRE CHAUDE ET D'ORANGERIE

Disponibles pour l'automne 1849 et le printemps 1850

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG.-NAP. BAUMANN,

Horticulteur, membre de plusieurs sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises,

A BOLLWILLER,

Poste restante SOULTZ, Haut-Rhin (France).



## Preisverzeichniss

Der Kalt- und Warmhaus-Pflanzen

die für das Spätjahr 1849 und Frühjahr 1850

bei Aug. Nap. Baumann,

Handelsgärtner, Mitglied mehrerer in- und ausländischen Garten- und Ackerbau-Gesellschaften,

IN BOLLWILLER,

Poste restante SOULTZ, Oberrheinisches Departement (Frankreich),

zu verkaufen sind.



MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE P. BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

1849.



## CONDITIONS.

---

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose à trois mois du montant de mes factures dépassant 50 fr.; pour celles au-dessous, j'en fais suivre l'importance en remboursement.

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle ou Augsbourg, faute de quoi je ferais suivre le remboursement.

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques et périls du voyage, sont au compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.

---

## BEDINGUNGEN.

---

Die verehrten Liebhaber sind gebeten ihre Adresse und die Bestimmung, wie auch die Versendungsweise genau anzugeben.

Den Betrag meiner Facturen die sich über 50 Fr. belaufen, entnehme ich auf 3 Monat. Mindere Summen nehme ich auf den Sendungen nach. Abnehmer mit denen ich in Rechnung stehe, machen natürlich Ausnahme; Liebhaber mit denen ich noch nicht die Ehre habe in Verbindung zu stehen, sind gebeten ihren Bestellungen ein Mandat auf Paris, Strassburg, Basel, Mülhausen, Frankfort a/M. oder Augsburg beizufügen; widrigenfalls wird der Betrag ohne Rücksicht der Summe nachgenommen.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniss meiner Auslagen dafür, besonders berechnet, und theilweise durch unentgeldliche Zulage aufgewogen.

Das Porto und die Versendungskosten, nebst den Reisegefahren, sind auf Rechnung des Käu-fers; meinerseits werde ich alle Sorgfalt darauf verwenden um die Sendungen in gutem Zustande an ihre Bestimmung gelangen zu lassen.



PLANTES DE SERRE CHAUDE.

Warmhaus-Pflanzen.

OBSERVATIONS.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut arriver, à la suite de fortes demandes, que je manque momentanément de quelques plantes portées sur mon catalogue; JE PRIE MESSIEURS LES COMMETTANS DE M'AUTORISER A LES REMPLACER PAR DES NOUVEAUTÉS ANALOGUES, ou de m'indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

J'apporterai les soins les plus scrupuleux au bon conditionnement de mes envois, QUI VOYAGERONT AUX RISQUES ET PÉRILS DES DEMANDEURS.

A la réception de plantes de serre restées en route pendant quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer les pots dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord à l'air, et ensuite au soleil. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en opérant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

Bemerkungen.

Die beste Zeit zur Versendung der Hauspflanzen, ist April, Mai, September und October; wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriameter übersteigt, kann man die übrigen Sommermonate auch benutzen.

Wegen strengem Absatz kann es sich treffen dass mir das eine oder das andere augenblicklich ausgeht. Ich bitte die Herrn Besteller mir bei deren Order die Vollmacht zu geben, das fehlende mit ähnlichen Neuheiten zu ersetzen, oder mir selbst Sorten angeben die ich an deren Stelle senden soll.

Ich thue immer alles was in meinen Kräften steht, die Verpackung der Pflanzen, die auf Gefahr der Herrn Besteller reisen, so gut als möglich zu besorgen.

Beim Empfang einer Sendung Pflanzen die lange auf der Reise geblieben sind, thut man wohl diese beim Aufpacken in einen warmen Kasten, in Lohe einzugraben und während einigen Tagen vor den Sonnenstrahlen und der Luft zu bewahren. Wenn man bemerkt dass sie anfangen sich zu bewegen, gewöhnt man sie nach und nach, zuerst an die Luft und dann an die Sonne; so kann man sie leicht wieder in ihren Normalzustand zurückbringen.

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
<b>Abutilon</b> pæoniæflora. . . . .		1	»	<b>Achimenes</b> Liebmanni . . . . .		1	»
venosum. . . . .		1 à 2	»	longiflora (DC.) . . . . .		50 c.	à 1 f.
<b>ACHIMENES</b> alba. <i>Niphæa oblongata</i>		»	50	latifolia . . . . .		1	50
argyrostygma . . . . .		»	50	rosea . . . . .		1	»
<b>Baumanniana</b> (Regel) . . . . .		2	»	multiflora . . . . .		1	50
Bodmeri (Regel). . . . .		3	»	patens. . . . .		»	75
Bradini . . . . .		»	50	pedunculata . . . . .		»	50
100 bulbes. . . . .		10	»	picta . . . . .		»	50
coccinea (Pers.). <i>Trevirana coccinea</i> .		»	50	<b>Smaragтина</b> (Regl). . . . .		5	»
100 bulbes. . . . .		5	»	tubiflora. . . . .		»	50
grandiflora . . . . .		1	»	le 100 bubilles . . . . .		5	»
rosea . . . . .		»	50	urticæfolia . . . . .		»	75
Kermesina . . . . .		1	»	<b>ACHMEA</b> discolor . . . . .		3 à 10	»
<b>Escheriæna</b> (Rgl), <i>magnifique variété à très-grandes fleurs d'un violet amarante</i> .		3	»	fulgens . . . . .		3 à 10	»
striata. . . . .		1	»	<b>Agave</b> fœtida, forte plante . . . . .		35	»
Ghisbrechti. . . . .		1	50	<b>Aloplectus</b> specissus? . . . . .		10	»
gracilis . . . . .		»	50	<b>Alpinia</b> nutans (Bot. Mag.). <i>Renealmia</i>			
grandiflora (DC.). <i>A. Ghiesbrechti</i> . .		»	50	nutans (And.). . . . .		2	»
le 100 bubilles . . . . .		8	»	<b>Alyxia</b> Richardsoni (Bot. Reg.) . . .		1 à 2	»
hirsuta . . . . .		1	»	<b>Amaryllis</b> . <i>Voyez le Catalogue des</i>			
ignea . . . . .		»	50	oignons et fleurs. Man sehe der			
illicifolia. . . . .		»	50	Zwiebel-Catalog. . . . .			
100 bulbes. . . . .		10	»	<b>Amonum</b> Zingiber (L.). <i>Zingiber offi-</i>			
				cinale. . . . .		4	»
				<b>Aralia</b> arborea (Lin.) . . . . .		2 à 4	»



	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
<b>Aralla</b> umbellifera (Lam.) . . . . .		2 »	<b>Bouvardia</b> triflora . . . . .		2 »
<b>Ardisia</b> colorata (Link.) . . . . .		1 à 5 »	<b>Brexia</b> madagascariensis (H. Kew.) . . . . .		3 »
complanata Flor. ind. . . . .		2 »	serrata (Presl.) . . . . .		3 »
crenulata. . . . .		50 c à 2 f.	<b>Bromelia. Ananas.</b>		
6 jeunes plantes de 10 centimètres. . . . .		3 »	Ananas (Linn.) . . . . .		1,50 à 6
hymenandra (Wall.) . . . . .		2 à 8 »	à feuilles panachées . . . . .		6 à 10 »
humilis . . . . .		2 »	à feuilles lisses, recommandable par		
<b>Arthrostemma</b> parietarium. <i>Centra-</i>			la qualité de son fruit . . . . .		4 à 10 »
denia rosea . . . . .		» 50	Antiochia black . . . . .		» »
<b>Arum</b> bicolor . . . . .		1 »	bracteata . . . . .		2 à 8 »
Colocasia (C.). Colocasia antiquorum. . . . .		1 à 20 »	Enville . . . . .		10 »
cordifolium . . . . .		1 à 2 »	globe, gros fruit . . . . .		3 à 6 »
indicum . . . . .		10 »	hémisphérique, gros fruit . . . . .		3 à 6 »
Mafafa . . . . .		5 »	Karatas . . . . .		3 »
ramosum (Link.) . . . . .		5 »	macrocarpa . . . . .		6 »
sagittæfolium . . . . .		1 »	nervosa . . . . .		6 »
viviparum (Lood.) . . . . .		3 »	<b>Ananas de la Martinique, ou</b>		
<b>ASPIDISTRA</b> elatior fol. varieg. . . . .		1 50	commun.		
<b>Astrapæa</b> Wallichii (Ker.) . . . . .		1 à 10 »	Plantes d'une année, les 12 . . . . .		35 »
<b>Bambusa</b> arundinacea (Retz.) . . . . .		2 »	» de 2 années . . . . .		65 »
<b>Banisteria</b> argentea. <i>Heteropteris ar-</i>			» de 3 années, pour fruits, les 12 . . . . .		70 »
gentea . . . . .		5 »	<b>Brosimum</b> Alicastrum. <i>B. microcar-</i>		
laurifolia (Lin.) . . . . .		2 »	pum . . . . .		3 »
<b>Barbacenia</b> purpurea (Hook.) . . . . .		2 à 8 »	<b>Brugmansia</b> arborea non. <i>B. candida</i>		1 »
<b>Bauhinia</b> sulphurea ? . . . . .		3 »	floribunda . . . . .		1 »
<b>Baumannia</b> geminiflora (DC.) . . . . .		1 à 4 »	Knightii . . . . .		1 »
<b>Beaumontia</b> grandiflora (Bot. Reg.) . . . . .		1 à 2 »	<b>Brunfelsia</b> americana (Lin.) . . . . .		2 »
<b>Begonia</b> argyrostigma (Bot. Reg.), <i>ma-</i>			violacea . . . . .		1 »
culata (Red.) . . . . .		1 »	<b>Caladium</b> odoratum (Roxb.) . . . . .		2 à 4 »
canaliculata . . . . .		1 »	<b>Calostemma</b> Cunninghami (Ait.) . . . . .		5 »
caulostygma . . . . .		2 »	<b>Canna</b> gigantea . . . . .		1 50
coccinea . . . . .		1 »	grandis . . . . .		2 »
digitata . . . . .		2 »	Lambertii ? . . . . .		1 50
eriocaulon ? . . . . .		3 »	leptochila (Bouché). . . . .		1 50
fagifolia . . . . .		1 50	longifolia glauca du Brésil . . . . .		3 »
fuchsioides . . . . .		1 »	patens )Rose) . . . . .		1 50
grandis (Dryand.) . . . . .		1 »	spectabilis . . . . .		2 »
hydrocotylefolia . . . . .		1 »	<b>Carolinea</b> alba . . . . .		5 »
macrophylla (Dryand.) . . . . .		1 50	insignis (Hort.) . . . . .		8 »
manicata . . . . .		1 »	<b>Cecropia</b> concolor ? nouvelle espèce à		
Moehringi (Rgl.) . . . . .		2 à 3 »	très-grandes feuilles maculées, de		
Une magnifique espèce développant			Sumatra . . . . .		20 »
ses belles fleurs roses pendant tout			palmata . . . . .		5 »
l'hiver.			peltata (Lin.) . . . . .		3 »
organa . . . . .		3 »	<b>Cerbera</b> Thevetia (Lin.) . . . . .		2 »
peltata . . . . .		1 »	<b>Ceropegia</b> stapeliæformis (Haw.) . . . . .		1 »
peponæfolia . . . . .		2 »	<b>Chamberlayna</b> spectabilis . . . . .		2 à 3 »
sinuata (Wall.) . . . . .		1 »	<b>Chirita</b> sinenses (Fl. de Van Houtti) . . . . .		1 »
Species du Brésil. <i>B. coccinea</i> ? . . . . .		2 »	zeilanica . . . . .		2 à 3 »
vitifolia . . . . .		1 »	<b>Cinnamomum</b> dulce . . . . .		3 »
Warsowizki, hybride du <i>B. manicata</i>		» 50	<b>Clavia</b> ornata (Don.) . . . . .		10 »
<b>Billbergia</b> clavata (Lin.) . . . . .		1 à 3 »	<b>Clivea</b> nobilis (Lind.) . . . . .		3 à 15 »
iridifolia (Lindl.) . . . . .		2 »	<b>Clerodendron</b> fragrans (Willd.). <i>Val-</i>		
pyramidalis (Lind.) . . . . .		1 50	kameria japonica (Th.) . . . . .		1 à 2 »
zebrina . . . . .		4 »	flore pleno . . . . .		1 à 2 »
<b>Bonaparteia</b> elegans (Hort.). <i>Roulinia</i>			hastatum . . . . .		1 50
Brong. . . . .		5 »	Hugeli . . . . .		5 »
Un magnifique exemplaire . . . . .		30 »	papilio . . . . .		2 »
juncea (R. P.) . . . . .		3 »	splendens (Knight.) . . . . .		2 »
<b>Boopha</b> ciliaris (Herb.) . . . . .		4 »	flore albo . . . . .		2 »



	La pièce.	fr.	c.
<b>Clerodendron</b> squamatum verum. . . . .	3	»	
<b>Coburgia</b> flava ? . . . . .	4	»	
fulva (Herbert) . . . . .	2	»	
<b>Coccoloba</b> barbadensis . . . . .	5	»	
laurifolia. . . . .	8	»	
pubescens . . . . .	10 à 20	»	
Rheifolia (Desf.). <i>C. latifolia</i> . . . . .	10	»	
species ? <i>magnifique</i> . . . . .	50	»	
<b>Coffea</b> arabica (L.) . . . . .	2 à 10	»	
Moriziana . . . . .	3	»	
species de la Havane . . . . .	5	»	
<b>Columnnea</b> crassifolia . . . . .	2	»	
grandiflora . . . . .	1 50	»	
hirsuta. . . . .	1	»	
longifolia (L.). <i>C. Lindleyana</i> . . . . .	» 50	»	
scandens . . . . .	2	»	
Schiedeana . . . . .	1 50	»	
zebrina . . . . .	2	»	
<b>Crinum.</b> <i>Voyez le Catalogue des oignons et bulbes. Man sehe den Zwiebln-Catalog.</i>			
<b>Curculigo</b> recurvata (Dryand) . . . . .	1 à 5	»	
<b>Curcuma</b> musacea . . . . .	10	»	
<b>Cyperus</b> papyrus. . . . .	2	»	
alternifolius . . . . .	1 50	»	
vegetus . . . . .	2	»	
<b>Dichorisandra</b> avata (Mart.) . . . . .	3	»	
<b>DIONÆA</b> muscipula (L.) . . . . .	1,50 à 3	»	
6 jeunes plantes, avec indication de culture . . . . .	6	»	
<b>Dombeya</b> Erythroxylon . . . . .	3	»	
<b>Dracaena</b> amaryllifolia ? . . . . .	10	»	
arborea (Link.) . . . . .	5	»	
australis (Forst.) . . . . .	4	»	
Une forte plante . . . . .	10	»	
brasiliensis (Hort.) . . . . .	4	»	
Draco (Willd.) . . . . .	3	»	
Une forte plante . . . . .	15	»	
Un exemplaire avec un tronc de 1 <sup>m</sup> ,65 de hauteur . . . . .	40	»	
cernua (Jacq.) . . . . .	5	»	
nigra . . . . .	10	»	
paniculata ? an. nova species . . . . .	4	»	
salicifolia . . . . .	4	»	
terminalis (L.) . . . . .	2 à 5	»	
foliis variegatis . . . . .	2 à 10	»	
undulata ? . . . . .	5	»	
<b>Dyckia</b> rariflora (Scult.) . . . . .	2	»	
remotiflora (Otto) . . . . .	1 à 3	»	
<b>Drymonia</b> punctata . . . . .	1	»	
<b>Erythrina</b> caffra (Bot. Reg.) . . . . .	3	»	
arborea (Sacq.) . . . . .	2	»	
corallodendron (Linn.) . . . . .	4	»	
crista galli . . . . .	1 à 5	»	
herbacea (L.) . . . . .	4	»	
picta (Lin.) . . . . .	5	»	
speciosa (Andr.) . . . . .	3 à 6	»	
species du Mexique, à belles feuilles d'un vert foncé . . . . .	10	»	
<b>Euphorbia</b> canariensis . . . . .	1	»	

	La pièce.	fr.	c.
<b>Euphorbia</b> caput Medusæ . . . . .	1	»	
Jacquiniiflora (Hort.). <i>Euph. fulgens</i> (Karv.) . . . . .	1	»	
Breoni (Hortul.) . . . . .	1	»	
lophogona (Lam.) . . . . .	2	»	
pulcherrima (Willd.). <i>Poinsettia pulcherrima</i> . . . . .	1	»	
sanguinea . . . . .	2	»	
splendens (Bojer) . . . . .	1 à 3	»	
<b>Ficus</b> australis (Willd.) . . . . .	1 50	»	
elastica (Roxb.) . . . . .	1 à 10	»	
laurifolia . . . . .	3	»	
repens (Roxb.) . . . . .	» 50	»	
species du Brésil, à feuilles luisantes d'un vert clair, belle plante . . . . .	5	»	
<b>FOURCROYA</b> longæva (Karw.), fort. . . . .	50	»	
<b>Franciscea</b> hydrangiæformis. . . . .	3 à 4	»	
latifolia . . . . .	2 à 4	»	
Pohlana . . . . .	1 50	»	
uniflora . . . . .	1 à 3	»	
6 plantes florifères. . . . .	4	»	
<b>Galactotendron</b> speciosum ? . . . . .	3	»	
utile (H. B.), vera. . . . .	10	»	
<b>Gardenia</b> florida (L.) . . . . .	1 à 3	»	
flore pleno . . . . .	1 à 3	»	
latifolia (Ait.) . . . . .	3 à 6	»	
radicans (Thunb.) . . . . .	50 c à 3f.	»	
Greffé en tige sur G. Florida. . . . .	2	»	
Scherbourniana . . . . .	4	»	
tetrasperma (Roxb.) . . . . .	1	»	
<b>GASTONIA</b> palmata (Roxb.) <i>Gilibertia palmata</i> . . . . .	5 à 30	»	
<b>Gessneria</b> Douglasii . . . . .	2	»	
elongata (H. B.) . . . . .	1 50	»	
Geroldtiana. . . . .	1	»	
grandis (Sw.) . . . . .	2	»	
Huttei nova . . . . .	2	»	
pendulina. <i>G. aggregata</i> . . . . .	2	»	
Schotti (Mikan.) . . . . .	1 50	»	
Zebrina . . . . .	1 à 3	3	
<b>Globa</b> erecta (Red.) . . . . .	2	»	
<b>Gloxinia</b> caulescens. . . . .	1	»	
bicolor . . . . .	2	»	
maculata (l'Hérit.) . . . . .	1	»	
maxima . . . . .	1	»	
pallida . . . . .	1	»	
Cerina . . . . .	1 50	»	
digitaliflora. . . . .	1	»	
formosa . . . . .	1	»	
gesnerioides . . . . .	2	»	
Goodii . . . . .	1	»	
hirsuta . . . . .	1 à 3	»	
insignis rubra. . . . .	1	»	
magniflora . . . . .	1 50	»	
Menziesi. . . . .	1 à 2	»	
Muziana. . . . .	3	»	
obscura . . . . .	1	»	
Priestleyana . . . . .	1	»	
Reine des Pays-Bas. . . . .	1	»	
rubra . . . . .	1	»	



	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
<b>Gloxinia rubra speciosissima</b> ,			<b>Magnolia</b> pumila. . . . .	2 à 4 »	
nouveau gain superbe. . . . .	3 »		<b>Malpighia</b> coccifera . . . . .	1 »	
speciosa (Lod.) . . . . .	» 50		<b>Manettia</b> cordifolia (Mart.) . . . . .	1 »	
flore albo. <i>G. candida</i> . . . . .	1 »		<b>Maranta</b> capitata (R. et B.) . . . . .	1 50	
<b>Guthnikia</b> mimulœflora . . . . .	2 »		grandis . . . . .	2 »	
<b>GUZZMANIA</b> tricolor (R. P.) . . . . .	4 à 10 »		zebrina (Spr.) <i>Calathea zebrina</i> (B. R.) .	2 à 5 »	
<b>Habrothamnus</b> elegans . . . . .	1 50		<b>Melastoma</b> macrocarpum . . . . .	3 »	
cyaneus . . . . .	1 »		macrophyllum. . . . .	2 »	
fasciculatus. . . . .	1 »		Selloi . . . . .	1 »	
<b>Hæmanthus.</b> ( <i>Voyez le Catalogue des</i>			<b>Metternichia</b> princeps . . . . .	25 »	
<i>oignons et fleurs.</i> ) <i>Man sehe den</i>			<b>Mimosa</b> procera ? . . . . .	3 »	
<i>Zwiebeln-Catalog.</i>			pudica (Linn) . . . . .	1 »	
<b>Hedychium</b> angustifolium (Roxb.) . .	2 »		strigulosa ? . . . . .	2 »	
coronarium (Kœn.) . . . . .	1 50		<b>Murraya</b> exotica (Linn.) . . . . .	1 50	
Gardnerianum (Wall.) . . . . .	2 »		<b>Musa</b> rosacea (Jacq.) . . . . .	3 à 6 »	
<b>Heliconia</b> Bihai (Willd.) . . . . .	2 »		Cavendishii (Paxt.) . . . . .	2 à 10 »	
speciosa . . . . .	2 »		coccinea (Andr.) . . . . .	6 »	
<b>Heliotropium</b> grandiflorum (Schr.) .	1 »		indica rosacea nova . . . . .	5 »	
arborescens . . . . .	1 50		speciosa (Tenor.) . . . . .	4 à 10 »	
Triomphe de Liège. . . . .	1 50		Zebrina . . . . .	20 à 40	
Voltairianum . . . . .	1 »		<b>Musanda</b> macrophylla . . . . .	3 »	
<b>Hibiscus</b> Cameronis . . . . .	1 »		<b>Myrtus</b> pimenta (Linn.) . . . . .	2 à 3 »	
puniceus. Sp. nova. fleur de 15 cent.	6 »		vera . . . . .	2 à 3 »	
rosa sinensis (L.) . . . . .	1 50		<b>NAPOLEONA IMPERIALIS</b> (Br.) .	10 à 20	
purpureo pleno . . . . .	1 50		<b>Nemathanthus</b> Guillemirii . . . . .	1 »	
mutabilis pygmeus . . . . .	5 »		<b>NEPENTHES</b> distillatoria . . . . .	15 »	
pedunculatus (Thunb.) . . . . .	2 »		<b>Nerium</b> caudatum (Lam.) . . . . .	3 »	
<b>Inga</b> pulcherrima. . . . .	2 »		<b>Osbeckia</b> canescens . . . . .	2 »	
species ? mexico. . . . .	8 »		<b>Oxalis</b> Barrelieri (Linn.) . . . . .	1 50	
<b>JACARANDA</b> filicifolia . . . . .	3 »		ruscifolia. . . . .	3 »	
<b>Jasminum</b> Azoricum. . . . .	1 à 3 »		<b>Oxyanthus</b> versicolor . . . . .	2 »	
grandiflorum . . . . .	1 à 3 »		<b>Pogostemon</b> Patchouly. . . . .	1 50	
Sambac (Ait.), flore pleno. . . . .	1 50		<b>Pancratiun.</b> — <i>Voyez le Catalogue</i>		
mu tiflorum . . . . .	1 »		<i>des plantes bulbeuses et oignons. Man</i>		
<b>Jatropha</b> glandulosa . . . . .	10 »		<i>sehe das Blumenzwiebeln-Catalog.</i>		
<b>Justicia</b> cristata (Jacq.) . . . . .	2 »		<b>Piper</b> Betel . . . . .	5 »	
oblongata (Link.) . . . . .	2 »		flexuosum . . . . .	1 »	
sinensis . . . . .	1 »		magnoliaefolium . . . . .	1 »	
speciosa . . . . .	2 à 4 »		nigrum . . . . .	1 50	
<b>Kæmpfera</b> elegans. <i>Monolophus ele-</i>			ulmifolium . . . . .	1 50	
<i>gans</i> . . . . .	2 »		<b>Pitcairnia</b> altens (L.) ? . . . . .	1 à 3 »	
longa (Jacq.) . . . . .	1 à 2 »		intermedia (Hort.) <i>P. furfuracea</i> (R.		
ovata . . . . .	2 »		M.) . . . . .	2 »	
rosea . . . . .	1 »		melananthera ? . . . . .	2 »	
<b>Kookia</b> punctata . . . . .	4 à 6 »		pnnicea, <i>force à fleurir.</i> . . . . .	1 »	
<b>Lantana</b> formosa. . . . .	1 »		Les 12 plantes . . . . .	6 »	
geroldiana . . . . .	1 »		ringens. <b>Nouvelle et magnifique</b>		
lilacina . . . . .	1 »		<b>plante</b> . . . . .	3 »	
nivea . . . . .	1 50		<b>Plumbago</b> cœrulea (Humb.) . . . . .	1 50	
pulcherrima. . . . .	1 »		Larpentæ . . . . .	2 »	
Selloi (Link.) . . . . .	» 50		scandens. fl. albo ? . . . . .	1 50	
<b>Laurus</b> cassia . . . . .	3 »		<b>Plumiera</b> rubra . . . . .	3 »	
Cinnamomum. . . . .	3 à 5 »		<b>Poinciana</b> lutea. . . . .	6 »	
involucrata. . . . .	1 50		pulcherrima coccinea. . . . .	5 »	
<b>Limonia</b> spectabilis. . . . .	10 à 20		regia (Bojar) . . . . .	5 à 20 »	
trifoliata (L.) . . . . .	1 50		<b>Polymnia</b> grandis . . . . .	2 »	
<b>LUCULIA</b> gratissima (Sweet.) . . . .	3 à 8 »		<b>Pontederia</b> crassipes (Mart.) . . . .	1 50	
pinceana. . . . .	5 à 10 »		<b>Pothos</b> cordata (L.) . . . . .	2 »	
<b>Magnolia</b> fuscata (Andr.) . . . . .	1 50 à 6		crassifolia . . . . .	2 »	
odoratissima. <i>Talauma Condollei</i> . .	5 »		longifolia, <i>Anthurium longifol.</i> (R. S.)	2 »	



	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
<b>Pothos undatus</b> . . . . .		2 »	<b>Tacca phalifera</b> (Bojer) . . . . .		6 à 15 »
<b>Puya Altensteinii</b> . . . . .		2 à 4 »	<b>Thalia dealbata</b> ? an spec. nova. <i>Magnifique plante aquatique à fleurs très-grandes jaune serin, de Bolivie</i>		10 »
<b>Rhex elegans</b> . . . . .		1 »	<b>Théophrasta americana</b> . . . . .		6 à 25 »
<b>RHODOSTOMA gardenioides</b> . . . . .		1 à 3 »	<b>Tillandsia amœna</b> (Link.) . . . . .		2 »
<b>Rondeletia speciosa</b> (Hort.) . . . . .		2 »	<i>farinosa</i> . . . . .		2 »
<b>Ruellia formosa</b> . . . . .		1 »	<i>nigra</i> . . . . .		2 à 4 »
<i>varians</i> (Vent.) . . . . .		1 »	<i>pyramidalis</i> . . . . .		2 »
<b>Russelia multiflora</b> . . . . .		1 »	<i>splendens</i> . . . . .		10 »
<b>Saccharum officinarum</b> (L.) . . . . .		3 »	<i>Zonata</i> , <i>T. Zebrina</i> . . . . .		3 »
<b>Sansevieria ginensis</b> . . . . .		3 »	<b>Tradescantia Deckeriana</b> . . . . .		2 50
<i>Roxburghiana S. Zeilanica</i> . . . . .		4 »	<i>discolor</i> (Ait.) . . . . .		1 »
<b>Schotia latifolia</b> (Jacq.) . . . . .		5 »	<i>Zebrina</i> , pour tapisser les murs des serres chaudes . . . . .		1 »
<i>speciosa</i> (Jacq.) . . . . .		2 »	<b>Vezenia floribunda</b> . . . . .		1 à 3 »
<b>Sinninghia villosa</b> . . . . .		1 »	<b>Vinca rosea</b> (L.) . . . . .		1 »
<b>Sipanea carnea</b> . . . . .		1 »	<i>rosea flore albo</i> . . . . .		1 »
<b>Solanum Herbertianum</b> . . . . .		1 »	<b>Xylophylla arbuscula</b> (W.) . . . . .		1 50
<i>quitense</i> (N. B.) . . . . .		2 »	<i>falcata</i> (W.) . . . . .		1 50
<b>Solandra grandiflora</b> (Swartz) . . . . .		2 »	<i>latifolia</i> . . . . .		2 »
<i>nitida</i> (Zueg.) . . . . .		3 »	<i>pinnatifida</i> . . . . .		2 »
<b>Spironema fragrans</b> . . . . .		» 50	<b>Zephyranthus</b> . — <i>Voyez le Catalogue des oignons et bulbes. Man sehe den Zwiebeln-Catalog.</i>		
<b>Stephanotis floribunda</b> . . . . .		1 »	<i>Une collection de 25 plantes bien assorties à mon choix. Eine Sammlung gut gewählter Warmehaus-Pflanzen nach meiner Wahl</i> . . . . .		25 »
<b>Sterculia acerifolia</b> (Cunningh.) . . . . .		1 50			
<i>platanifolia</i> . . . . .		2 »			
<b>Strelitzia angusta</b> (Th.) . . . . .		30 à 100			
<i>farinosa</i> (Dryand)? . . . . .		25 à 50			
<i>humilis</i> (L.) . . . . .		5 à 15 »			
<i>imperialis</i> . . . . .		100 »			
<i>Regina</i> (Ait.) . . . . .		10 à 80			
<i>spathulata, vera</i> . . . . .		20 »			
<b>Sweetenia Mahagoni</b> . . . . .		5 à 20 »			

## CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANÆÆ.

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
<b>Areca pinanga</b> . . . . .		10 à 60	<b>Chamærops humilis</b> (Linn.) . . . . .		2 à 15
<i>rubra</i> (Boyr.). <i>Euterpe pisifera</i> . . . . .		5 à 15	<i>Palmetto</i> (Mich.) . . . . .		2
<i>Un exemplaire de 2<sup>m</sup>,50, fort</i> . . . . .		50	<i>Deux forts exemplaires d'égale grandeur</i> . . . . .		25
<b>ATALEA COHUNE</b> (M.), <i>jeune plante</i> . . . . .		100	<i>Un exemplaire beaucoup plus fort</i> . . . . .		30
<b>Bactris setosa</b> . . . . .		10 à 30	<b>Cocos chilensis</b> . <i>Jubea spectabilis</i> . . . . .		3 à 10
<i>flavispina</i> . . . . .		15 à 20	<i>flexuosa, fort</i> . . . . .		60
<i>maraya</i> Mart. . . . .		30 à 80	<i>oleracea</i> . . . . .		18 à 15
<b>Calamus Draco</b> . . . . .		10 à 20	<i>species N° 1, de 2 mètres de hauteur</i> . . . . .		100
<b>Carludowigia angustifolia</b> . . . . .		5 à 25	<b>CORYPHA AUSTRALIS</b> , <i>forte plante, pétioles des feuilles de 1<sup>m</sup>,50 de long, magnifique</i> . . . . .		500
<i>latifolia</i> . . . . .		8 à 30	<i>Miraguama, Copernica Miraguama</i> . . . . .		5 à 25
<i>palmata</i> . . . . .		8 à 20	<b>Cycas circinalis</b> . . . . .		20 à 60
<i>viminalis</i> . . . . .		80	<i>revoluta</i> . . . . .		5 à 80
<b>Caryota urens</b> (Linn.) . . . . .		35	<i>species N° 1</i> . . . . .		100
<b>Ceratozamia Mexicana</b> . . . . .		30 à 50	<i>N° 2</i> . . . . .		100
<b>Ceroxylon andicola</b> . . . . .		30 à 80	<b>DIPLOTHEMIUM Maritimum</b> , <i>très-fort</i> . . . . .		100
<b>Chamædora aurantiaca</b> . . . . .		12 à 18	<b>Dion aculeatum</b> . . . . .		10 à 20
<i>elegans</i> . . . . .		20 à 50	<i>edule</i> . . . . .		10 à 20
<i>elator</i> . . . . .		20 à 30	<b>Elais guienensis</b> . . . . .		20 à 120
<i>martiana</i> . . . . .		30 à 50	<b>Elate sylvestris</b> . <i>Phoenix sylvestris</i> . . . . .		10 à 30
<i>scandens</i> ? . . . . .		15	<b>Euterpe caraihea</b> . <i>Oreodoxia oleracea</i> . . . . .		10 à 25
<i>Schiedeana</i> . . . . .		5 à 15			
<b>Chamærops exelsa</b> (Thunb.) . . . . .		2			
<i>Deux exemplaires d'égale hauteur, 65 centimètres en tige</i> . . . . .		25			



	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
<b>Fulchironia</b> senegalensis. <i>Phœnix syl-</i>			<b>Pinanga</b> latisecta. . . . .		30 à 60
<i>vestris</i> . . . . .		10 à 50	<b>Sabal</b> Adansoni . . . . .		1 à 15
<b>Guilielma</b> speciosa. . . . .		80	<b>Sagus</b> farinifera . . . . .		100
<b>Latania</b> rubra. . . . .		100	<b>Zalacca</b> asamica . . . . .		30 à 40
<b>Oreodoxia</b> acuminata. . . . .		10	<b>Zamia</b> horrida. . . . .		30
<i>regia</i> . . . . .		5 à 40	<i>Un très-grand exemplaire</i> . . . . .		200
<b>Palmier</b> nouveau de l'Honduras. . . . .		60 à 100	<i>integrifolia</i> . . . . .		20 à 80
<b>Pandanus</b> graminifolius. . . . .		1 à 15	<i>lanuginosa</i> . . . . .		40 à 100
<i>inermis</i> . . . . .		10 à 20	<i>muricata</i> . . . . .		10 à 20
<i>pygmeus</i> . . . . .		10	<i>pumila</i> . . . . .		40
<i>utilis</i> . . . . .		20 à 130	<i>pungens</i> . . . . .		40 à 100
<b>Phoenix</b> dactilifera . . . . .		1,50 à 25	<i>spiralis</i> . . . . .		5 à 60
<i>spinosa. Ph. Leonensis</i> . . . . .		50 à 60	<i>tridendata</i> . . . . .		40

## FOUGÈRES.

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
<b>Acrostichum</b> alcicorne (Sw.) . . . . .		1 »	<b>Campiloneurus</b> decurrens . . . . .		10 à 20
* aureum (L.) . . . . .		1 50	<i>repens</i> . . . . .		3 »
<i>conforme</i> . . . . .		3 »	<b>Ceropteris</b> sulphurea. . . . .		1 »
* <b>Adiantum</b> assimile (Sw.). <i>A tigri-</i>			* <b>Coenopteris</b> japonica (Thunb.) . . . . .		» 75
<i>num</i> (Labil.) . . . . .		1 50	<b>Cheilanthes</b> lentigera. . . . .		1 50
* concinum (H.) . . . . .		1 »	<i>hastata macrophylla ?</i> . . . . .		1 50
* curvatum . . . . .		1 »	<i>miconema</i> . . . . .		1 50
<i>formosum</i> (R. Br.) . . . . .		1 50	<i>pteridioides</i> . . . . .		1 »
* Moritzianum. . . . .		2 »	<i>rufescens</i> . . . . .		1 50
† pedatum . . . . .		1 »	<i>tomentosa</i> . . . . .		1 »
* pubescens (Schk.) . . . . .		1 »	<i>viscosa</i> . . . . .		1 50
* tenerum (Sw.) . . . . .		1 50	<b>Chrysopteris</b> spherodocarpa. . . . .		2 »
* trapeziforme (L.) . . . . .		2 »	<b>CYPOTIUM SCHIEDEI</b> , magnifique		
* <b>Alontodia</b> umbrosa . . . . .		2 »	<i>fougère en arbre</i> . . . . .		10 à 50
<b>Aneimia</b> collina (Radd.) . . . . .		1 50	† <b>Cystopteris</b> fragiles (Desu.) . . . . .		» 50
† <b>Aspidium</b> aculeatum . . . . .		1 »	* vivipara . . . . .		3 »
<i>brassiliense</i> (Willd.) . . . . .		1 »	<b>Davallia</b> canariensis . . . . .		1 »
* capense (Willd.) . . . . .		1 50	<i>solida ?</i> . . . . .		2 »
* cuneatum. . . . .		1 »	<b>Dicksonia</b> Davallioides . . . . .		3 »
* exaltatum. <i>Polypodium exaltatum</i> . . . . .		1 »	<i>pilosiuscula</i> . . . . .		1 0
<i>falcatum</i> (Sw.) . . . . .		1 50	<i>rubiginosa</i> . . . . .		1 »
* fœniscei . . . . .		1 »	<b>Dydimochlena</b> sinuata . . . . .		10 à 25
† fragile . . . . .		» 50	<b>Diplazium</b> decussatum ? . . . . .		3 »
* violascens . . . . .		1 »	<i>pubescens</i> . . . . .		1 50
<i>viviparum ?</i> . . . . .		» 75	<i>Scheperti</i> . . . . .		2 à 6 »
† <b>Asplenium</b> Adiantum nigrum . . . . .		» 50	* <b>Doodia</b> aspera (R. B.) . . . . .		1 »
<i>bisseratum</i> (Presl.) . . . . .		1 50	* <i>distans</i> . . . . .		1 50
† germanicum (Weiss.) . . . . .		1 »	<i>lupulata ?</i> . . . . .		» 50
* flabellifolium . . . . .		1 »	<i>rupestris</i> . . . . .		» 50
<i>furcatum</i> (Thunb.) . . . . .		2 »	* <b>Gymnogramme</b> chrysophylla (B.) . . . . .		1 »
* marimum . . . . .		1 »	* <i>calomelanos</i> (Kaulf.) . . . . .		1 »
† <i>Ruta muraria</i> (Lin.) . . . . .		1 50	<b>Lycopodium</b> alpinum (L.) . . . . .		» 50
* septentrionale (Sw.) . . . . .		» 50	* <i>apodum</i> (L.) . . . . .		1 »
† <i>trichomanes</i> (L.) . . . . .		» 50	<i>brasilien</i> se . . . . .		» 75
† <b>Athyrium</b> filix fœmina (Roth.) . . . . .		» 50	<i>cœsium</i> , <i>charmante plante</i> , <i>les feuil-</i>		
* <b>Bathmum</b> fraxinifolium . . . . .		2 à 4 »	<i>les sont à reflets azurés</i> . . . . .		» 75
<b>Blechnum</b> brassiliense . . . . .		4 à 10	* <i>circinatum</i> . . . . .		» 50
<i>glandulosum</i> . . . . .		1 »	* <i>cordifolium</i> . . . . .		» 50
* <i>gracile</i> (Kaulf.) . . . . .		1 »	* <i>stoloniferum</i> (Sw.) . . . . .		» 50
<i>lanceolatum</i> (Rud.) . . . . .		1 50	* <b>Marginaria</b> dimorpha. . . . .		3 »
<i>Patersoni</i> . . . . .		3 »	<b>Microsorius</b> irregularis . . . . .		1 50



	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
† <b>Nephrodium</b> acrostichoides (Mich.).		2 50	* <b>Pteris</b> nemoralis (W.) . . . . .		1 »
† dilatatum (Desw.) . . . . .		1 »	* serrulata (Willd.) . . . . .		2 »
† filix mas. (Desv.) . . . . .		1 »	stenophylla . . . . .		2 »
† Oreopteris (Desv.) . . . . .		» 50	† <b>Scolopendrium</b> officinarum (L.) .		» 75
* tuberosum . . . . .		1 »	† cristatum . . . . .		2 »
<b>Nipholobus</b> chinensis . . . . .		2 »	† undulatum . . . . .		1 »
rupestris . . . . .		1 50	† <b>Struthiopteris</b> germanica (W.) .		» 50
<b>Notochlena</b> pumila . . . . .		1 50	* <b>Tectaria</b> coriacea . . . . .		2 50
† <b>Onoclea</b> sensibilis . . . . .		1 »	* <b>Woodwardia</b> Onocleoides (Willd.).		2 »
† <b>Osmunda</b> interrupta . . . . .		3 »	† radicans . . . . .		1 50
† regalis . . . . .		1 »	Une collection de 10 espèces, à mon		
† <b>Phorolopus</b> crispus. <i>Pteris crispa</i> .		1 »	choix . . . . .		10 »
* <b>Polypodium</b> aureum (L.) . . . . .		1 »	Eine Sammlung von 10 Sorten nach mei-		
† calcareum . . . . .		1 »	ner Wahl . . . . .		10 »
* crassifolium (W.) . . . . .		3 »	Les espèces de serre chaude convien-		
* decurssive pinnatum . . . . .		1 50	nent bien dans un local où l'on cultive les		
* dryopteris (L.) . . . . .		1 »	Orchidées des pays chauds. Leurs feuil-		
* effusum (Sw.) . . . . .		2 »	lages déliés se marient d'une manière très-		
harpeoides . . . . .		3 »	agréable avec les formes larges et vigou-		
longifolium . . . . .		1 50	reuses des dernières.		
menisifolium . . . . .		2 50	Les espèces marquées d'un * peuvent		
paradisæ (Willd.) . . . . .		1 »	être cultivées en serre tempérée. Celles		
† rhæticum (Linn.) . . . . .		1 »	marquées d'une † sont pour la pleine terre.		
vacillans . . . . .		3 »	Celles sans marques doivent être cultivées		
† vulgare (Linn.) . . . . .		» 50	en serre chaude.		
* <b>Pteris</b> arguta (Willd.) . . . . .		3 »	Die Warmehaus-Farren eignen sich		
* biaurita . . . . .		6 »	hauptsächlich zur Decoration von Orchi-		
* chrysocarpa . . . . .		» 50	deæn-Hæuser. Ihre zarten Blattformen mit		
* crenata (L.) . . . . .		2 »	den kräftigen Formen der Orchideæn ge-		
* falcada (R. B.) . . . . .		2 »	mischt, bilden einen sehr angenehmen		
* flexuosa . . . . .		2 »	Contrast.		
* hastata . . . . .		1 »	Die mit * bezeichneten Sorten sind für		
* leptophylla (Sw.) . . . . .		1 50	temperirte Hæuser. Die mit †, für's freye		
* longifolia . . . . .		2 »	Land, die übrigen für warme Hæuser.		

## ORCHIDEÆ.

Je n'indique dans ce catalogue que les espèces qui se trouvent disponibles en bonnes plantes. Je possède encore beaucoup d'espèces indéterminées, que j'ai reçues depuis quelque temps de l'Inde, du Mexique et du Brésil, mais qui jusqu'à présent n'ont pas encore fleuri.

La richesse du coloris, les formes bizarres de ces fleurs, le port particulier de la plante, ainsi que l'odeur agréable et suave que la majeure partie d'entre elles exhalent, sont des avantages qui plaisent même isolément sur un végétal, mais que l'on trouve difficilement réunis comme dans cette famille, justement appréciée par les amateurs et connaisseurs.

Le meilleur moment pour l'expédition des Orchideæ, est du mois de Mars au mois d'Octobre.

Ils voyagent sans danger et peuvent rester des mois en route sans en souffrir.

Une température artificielle de 8 à 10° Réaumur au-dessus de 0 leur suffit en hiver.

In diesem Verzeichniss bemerke ich bloß solche Sorten die sich in schönen Exemplaren vorfinden. Ich besitze noch eine Menge unbestimmte Species die ich von verschiedenen Gegenden aus Indien, Mexiko und Brasilien erhalten, die aber bis heute noch nicht geblüht haben.

Der prachtvolle Farbens Schmuck dieser Blumen, das überraschende und höchst merkwürdige ihrer Blütenbildung und der seltsame schöne Habitus den Pflanze und Blume haben, so wie der liebliche und starke Duft vieler derselben, sind, einzeln und vereinigt betrachtet, hervorragende Eigenschaften, die in solchem Grade und in gleichem genussvollen Verhältnisse wohl sonst keine andere Blumengattung für die Kenner und Liebhaber aufweisen dürfte.

Die beste Versendungszeit der Orchideæ ist von März bis Ende Oktober. Sie reissen ohne Gefahr und können Monate lang unterwegs seyn ohne Nachtheil.

Die tropischen Orchideæ bedürfen im Winter eine Temperatur von 8 bis 10° Reanmur Wärme.



	<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>		<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>
<b>Agropera</b> Loddigesii (Lindl.). <i>Maxillaria galeata</i> Lodd. . . Mexique.		5 »	<b>Lycaste</b> aromatica . . . Mexique.		5 à 10 »
luteola. . . . . Id.		7 à 10 »	balsamea. . . . . ?		15 à 20
<b>Anæctochylus</b> argenteus . Pessang.		5 à 10 »	picturata. . . . . ?		20 à 30
pictus . . . . . ?		5 à 10 »	Skinneri . . . . . Guatemala		30 »
<b>Angræcum</b> maculatum (L.). Brésil.		5 à 10 »	<b>Marmodes</b> aromatica . . Mexique.		10 à 20
<b>Bifrenaria</b> atropurpurea (B. Cab. . . . . Id.		5 à 10 »	<b>Maxillaria</b> aromatica. <i>Ly-</i>		
aurantiaca (Bot. mag.) . . Demerara.		20 »	<i>caste aromatica</i> . . . . . ?		10 à 20
sulphurea . . . . . ?		15 »	densa . . . . . Mexique.		3 à 6 »
<b>Bletia</b> gracilis (Lindl.). . . ?		5 »	Deppei (Lodd.) . . . . . Id.		5 à 10 »
hyacinthina (Bot. mag.). . Chine.		3 »	Harrisoniæ (Lindl.). . . ?		5 à 8 »
purpurea ? . . . . . ?		20 »	punctata (Lodd.). . . . . Brésil.		5 »
Woodforti . . . . . ?		30 »	species N° 1 . . . . . Id.		50 »
<b>Bolbophyllum</b> barbigerum. Siera L <sup>ne</sup> .		20 »	squalens (R. Br.). . . . . Rio-Jan <sup>ro</sup>		3 »
<b>Brassavola</b> venosa. . . . . Hunduras.		5 à 10 »	stapelioides (Lindl.). . . Brésil.		5 à 20 »
<b>Broughtonia</b> sanguinea. . Jamaïca.		20 »	tetragona (Lindl.) . . . . . Id.		15 »
<b>Calanthe</b> bicolor. . . . . Japon.		3 à 10 »	<b>Miltonia</b> clovesiana grandifl. Id.		60 »
veratrifolia . . . . . Indes or.		10 »	Russeliana . . . . . Id.		60 »
<b>Cattleya</b> crispa (Lindl.) . . Brésil.		10 à 20	* <b>Neottia</b> picta (Sims.). . . ?		3 »
Forbesii (Ldl.). <i>C. isopetala</i> Id.		5 à 10 »	<b>Odontoglossum</b> Lindleyii. Guatemala		15 à 25
piperita . . . . . Id.		50 »	* <b>Oncidium</b> Ceboletta . . . Indes occ.		1 à 20 »
<b>Cymbidium</b> aloefolium (Sw) Indes or.		2 à 5 »	macrochilum . . . . . ?		5 à 20 »
ensifolium (Sw.). . . . . Chine.		2 »	* papilio (Lindl.). . . . . Trinidad.		20 à 30
dependens (Bot. Cab.) . . . Id.		20 »	sciurus . . . . . ?		30 »
sinense (Willd.). . . . . Id.		2 »	Species du Mexique. . . . Mexique.		80 à 100
<b>Cypripedium</b> insigne (Wall) Nepaul.		3 à 5 »	Species N° 3 de l'Hunduras. Hunduras.		50 »
purpuratum (Bot. Reg.). . Archipel.		25 »	» N° 4 . . . . . Id.		50 »
venustum (Wall.) . . . . . Nepaul.		5 à 10 »	S. H. du Brésil . . . . . Brésil.		50 »
<b>Dendrobium</b> aggregatum (L) Indes or.		20 »	<b>Peristeria</b> . Sp. Della Guera. D. Guera.		80 à 100
Baringtonii. . . . . ?		5 »	<b>Phajus</b> grandifolius. <i>Limo-</i>		
buxifolium ? . . . . . ?		5 »	<i>dorum Tankerwilliæ</i> (W.) Chine.		3 »
mostratum . . . . . Indes or.		60 »	<b>Pholidota</b> imbricata (Lindl.) Indes or.		4 »
nobile. . . . . Chine.		15 à 60	<b>Renanthera</b> coccinea (R.B.) Japon.		
oncidoides. . . . . ?			rosea . . . . . Chine.		20 »
Pierardi. <i>D. cuculatum</i> . . Indes or.		5 à 10 »	<b>Rodriguezia</b> Barkeri (R.B.) ?		10 »
pulchellum (Boxb.). . . . . Id.		3 à 10 »	<b>Schomburghia</b> crispa . . . ?		20 à 40
speciosum (Sm.). . . . . New-Holl.		5 »	<b>Stanhopea</b> Devoniensis. . Mexique.		30 »
<b>Epidendron</b> ciliare (Willd.) Martiniq.		4 à 10 »	ehurnea . . . . . ?		8 à 10 »
cochleatum (L.) . . . . . Indes occ.		3 à 5 »	grandiflora (Sw). . . . . Brésil.		10 »
latifolium . . . . . Id.		10 »	insignis (B. M.) . . . . . Mexique.		6 à 12 »
crassifolium. . . . . St-Vinct.			oculata (Sw.) . . . . . Brésil.		6 à 15 »
cuspidatum (Lodd.) . . . Mexique.		5 »	odoratissima . . . . . Id.		20 »
elongatum (Jacq.) . . . . . Id.		2 »	quadricornis . . . . . Mexique.		35 »
floribundum . . . . . Id.		10 à 15	saccata . . . . . Guatemala		20 »
odoratissimnm . . . . . ?		25 à 30	tigrina. . . . . Xalapa.		20 »
polybulbon (Sw.) . . . . . ?		4 »	Wardii . . . . . Mexique.		15 à 25
species du Mexique. . . . Mexique.		35 »	<b>Stenorhynchus</b> speciosus		
<b>Eria</b> floribunda. . . . . Chine.		4 à 6 »	(B. M.). <i>Neotia speciosa</i>		5 »
pubescens (Lindl.) . . . . . Id.		8 »	<b>Trichopilia</b> tortilis. . . . Mexique.		20 à 30
rosea . . . . . Chine.		15 »	<b>Vanilla</b> aromatica (H. K.). . Brésil.		20 »
stellata (Lindl.) . . . . . Java.		4 à 6 »	claviculata . . . . . Chine ?		20 »
<b>Gongora</b> atropurpurea (Hk.) Demerara.		15 »	planifolia. . . . . ?		5 »
pallida. . . . . Id.		15 »	pomponia . . . . . ?		10 »
odoratissima . . . . . Id.		70 »	<b>Zygopetalum</b> crinitum (R. K.). . . . . Brésil.		15 »
<b>Grobya</b> Amhertiæ . . . . . ?		15 à 20	Makayi (B. M.) . . . . . Id.		15 »
<b>Hæmaria</b> discolor . . . . . Brésil.		3 »	maxillaria (Sw.) . . . . . Id.		10 à 20
<b>Loelia</b> acuminata . . . . . Mexique.		40 »	odoratissimum. . . . . ?		
albida. . . . . Auxaca.		15 »	stenochyluy (Sw.) . . . . ?		10 »
grandiflora . . . . . Xalapa.		8 à 15 »	<i>A mon choix, 20 espèces assorties. Nach meiner Wahl, 20 Sorten assortirt .</i>		50 »



# PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

## Kalthaus-Pflanzen.

Une température de 3 à 4° Réaumur au dessus de 0 suffit, pour la conservation en hiver, aux plantes indiquées dans cette série, une température plus élevée par le soleil ne leur nuit nullement; mais néanmoins, par une température de quelques degrés au dessus de 0, il est avantageux de leur donner de l'air frais, en ouvrant les panneaux des serres.

Sæmmtliche hier angeführte Kalthaus-Pflanzen bedarfen nur 3 bis 4 Grad Wärme Reaumur zu ihrer Conservation. Eine höhere durch die Sonne verursachte Temperatur schadet übrigens den Pflanzen nichts; bei gelinder Witterung jedoch wird man wohl thun eine zu grosse Wärme durch theilweises öffnen der Fenster am Glashause zu verhüten.

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
<b>Acacia</b> alata (DC.) . . . . .	1	»		<b>Aloe</b> atrovirens (DC.). <i>Haworthia mar-</i>			
Berteriana (Spr.) . . . . .	1 à 2	»		garitifera (Haw.) . . . . .	1	50	
biflora (R. Br.). <i>A. hastulata</i> . . . . .	1	»		mitraeformis (Willd.) . . . . .	1	50	
cyanophylla (Renth.), <i>Ac. Swanriver</i>				plicatilis? . . . . .	1	50	
(Hort.) . . . . .	5	»		variegata (Lin.) . . . . .	1	50	
dealbata (Link.). <i>A. affinis</i> (Sweet.) . . . . .	1	50		virens (Haw.) . . . . .	1	50	
Esterhazy . . . . .	1	»		6 espèces assorties avec noms. . . . .	6	»	
floribunda (Willd.) . . . . .	2	»		<b>Alstroemeria</b> aurea (Gr.) . . . . .	1	»	
frondosa (Willd.) . . . . .	1	»		du Chili, en plusieurs variétés . . . . .	2	»	
glaucofolia. <i>A. cultroformis</i> . . . . .	2 à 5	»		Pelegria (L.) . . . . .	1	»	
heterophylla . . . . .	2	»		psittacina (Lehm.) . . . . .	1	»	
juniperina . . . . .	1	»		<b>Amicia</b> Zygomeres (DC.) . . . . .	50 c	à 2 f.	
latifolia (Desf.) . . . . .	1	»		<b>Anigozanthus</b> Lindenii . . . . .	3	»	
longifolia glauca . . . . .	10	»		<b>Amaryllis</b> . Voyez le catalogue des			
lophanta (Willd.) . . . . .	1 à 4	»		oignons et bulbes. Man sehe das Zwie-			
lunata nova. . . . .	8	»		belnverzeichniss.			
mucronulata (Mak.) . . . . .	5	»		<b>Angelonia</b> floribunda. . . . .	1 à 5	»	
Neumanni . . . . .	2	»		<b>Aralia</b> crassifolia . . . . .	10 à 40		
paradoxa (DC.) . . . . .	1	»		pinnata . . . . .	3	»	
pinifolia (Hortul.) . . . . .	1	50		trifoliata . . . . .	4 à 20	»	
glauca? an spec. nova Swanriver . . . . .	30	»		<b>Araucaria</b> . Voyez le catalogue des			
platyptera . . . . .	1 à 4	»		Conifères, première partie. Man sehe			
prostrata (Lodd.). Diffusa (Ker.) . . . . .	2 à 6	»		die Nadelhoelzer im ersten Theil.			
pulchella (R. Br.) . . . . .	1	»		<b>Abrutus</b> Andrachne (Willd.) . . . . .	1	»	
rigens . . . . .	2	»		canariensis (L.) . . . . .	2	»	
<b>Species. Arbre à gomme avec</b>				ferruginea nova . . . . .	10	»	
des phylloïdes de 6 à 8 décimètres				floribunda . . . . .	2	»	
de largeur et autant de longueur,				hybrida . . . . .	2	»	
une espèce magnifique . . . . .	50	»		longifolia (Loid.) . . . . .	2	»	
species de Swanriver . . . . .	30	»		Milleri (Don.) . . . . .	2	»	
truncata (Hortul.) . . . . .	1	»		pulverulenta nova . . . . .	10	»	
verticillata (Willd.) . . . . .	1	»		unedo . . . . .	1	»	
vestita (R. Br.) . . . . .	1 à 4	»		species N° 3, Mexique . . . . .	10	»	
<b>Agapanthus</b> foliis variegatis . . . . .	1	»		<b>Aristolelia</b> Maqui (Hérit.). <i>Cornus chi-</i>			
<b>Agave</b> Americana (Linn.), petit . . . . .	1	50		lensis Molin. . . . .	1	50	
moyenne force . . . . .	30	»		<b>Ardisia</b> japonica . . . . .	1	»	
très-fort . . . . .	200	»		<b>Astelia</b> Banksii, . . . . .	1	»	
foliis variegatis, petit. . . . .	1	50		<b>Aster</b> moschatus . . . . .	1	»	
moyenne pour vases, la paire . . . . .	20	»					
foliis striatis . . . . .	4	»		<b>AZALEA INDICA</b> (L.)			
virginica (Linn.) . . . . .	1	»		<b>Rhododendron indicum</b> (Sw.)			
<b>Agonis</b> marginata . . . . .	1	50		alba. . . . .	50 c	à 3 f.	
<b>Aloe</b> arborescens (Mill.) . . . . .	3 à 8	»					



	<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>		<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>
<b>Azalea indica</b> Rhodod. plena . . .	50 c. à 3 f.		<b>Azalea</b> Rhododendroides . . .	1 50	
Augusta Lady . . .	1 à 2 »		Sinensis . . .	1 à 2 »	
aurantiaca duplex . . .	1 à 4 »		Une collection de 24 variétés à mon choix .	12 »	
grandiflora . . .	1 à 2 »		Eine Sammlung von 24 Sorten nach mei-		
Baronne Pronay . . .	1 à 3 »		ner Wahl . . .	12 »	
Beckmanni . . .	2 »		Une collection de 12 variétés à mon choix .	5 »	
bicolor . . .	1 à 3 »		Eine Sammlung von 12 Sorten nach mei-		
carnea floribunda . . .	1 à 2 »		ner Wahl . . .	5 »	
coronata . . .	2 »				
Crimson . . .	50 c. à 2 f.		<b>Variétés assortis.</b>		
Cunninghami . . .	50 c. à 2 f.		<i>Plantes de moyenne force en 20 variétés,</i>		
Danielsi . . .	1 à 2 »		le 100 . . .	40 »	
amabilis . . .	2 50		Mittlere Stärke in 20 Sorten, das 100 .	40 »	
grandiflora . . .	2 à 3 »		<i>Plantes fortes en boutons en 20 variétés,</i>		
decora . . .	1 50		le 100 . . .	50 »	
Diego Leon . . .	3 »		Stark mit Knospen, das 100 in 20 Sor-		
elata plena . . .	1 à 2 »		ten . . .	50 »	
eximia . . .	2 »		<i>Plantes très-fortes en boutons, mélangées,</i>		
Exquisite . . .	2 à 3 »		le 100 . . .	60 »	
Foordi . . .	1 50		Ganz stark mit Knospen, Rummel, das		
grandiflora . . .	1,50 à 3		100 . . .	60 »	
insignis pleno . . .	1 à 2 »				
Jenneri . . .	1 50		<b>Baeckea</b> camphorata (R. Br.) . . .	1 »	
lacteola superba . . .	2 »		<b>Balsamia</b> latifolia . . .	» 75	
lateritia rosea ? . . .	2 »		repens . . .	» 75	
magnifica plena . . .	2 50		<b>BANKSIA</b> australis (R. Br.) . . .	5 »	
magniflora plena . . .	2 »		cuneifolia (Wendl.) . . .	3 à 4 »	
macrantha . . .	50 c. à 3 f.		denticulata (DC.) . . .	3 »	
Mazeppa . . .	1 »		Dryandroides (Baxt.) . . .	8 à 15 »	
Mazoratti . . .	2 »		ericæfolia (L. F.) . . .	2 à 10 »	
Minerva . . .	2 »		integrifolia (L. F.) . . .	4 »	
mutabilis . . .	1 »		latifolia (R. Br.) . . .	5 »	
Nedersiana . . .	2 à 3 »		marcescens (R. Br.) . . .	3 »	
new white . . .	1 »		marginata (Cav.) . . .	4 »	
Optima . . .	2 »		oblongifolia (Cav.) . . .	3 »	
phenicia alba ? . . .	2 »		serrata (L.) . . .	3 »	
phoenicea grandiflora . . .	1 à 3 »		spinulosa (Sm.) . . .	2 »	
Prima donna . . .	2 »		<b>Bauera</b> rubioides (And.) . . .	1 »	
Prince Albert . . .	2 »		<b>Beaufortia</b> decussata . . .	1 à 2 »	
puricea . . .	50 c. à 1 f.		splendens (Baxt.) . . .	1 »	
purpurea magnifica . . .	2 à 3 »		<b>Berberis</b> tenuifolia (Lind.) . . .	3 à 10 »	
Rawsoni . . .	1 »		trifoliata . . .	2 à 10 »	
Reine Louise . . .	2 »		<b>Billardiera</b> fusiformis (Lab.) Sollya		
refulgens . . .	2 »		heterophylla (Lindl.) . . .	1 »	
rosea elegans . . .	2 »		<b>Boronia</b> alata (Sm.) . . .	2 »	
maculata . . .	2 »		crenulata . . .	1 à 3 »	
rotundifolia . . .	1 »		serrulata (Sm.) . . .	2 »	
Salmon . . .	1 »		viminea . . .	1 »	
Skrimakerski . . .	1 »		<b>Bossiaea</b> thymifolia (Hort.) . . .	» 50	
Smithii coccinea . . .	1 »		<b>Bouwardia</b> flava . . .	» 75	
elegans . . .	2 »		strigulosa . . .	50 c. à 1 f.	
speciosa . . .	50 c. à 2 f.		triflora . . .	1 »	
splendens . . .	1 à 2 »		<b>Brachysema</b> platyptera. <i>Sontania Cel-</i>		
superba plena . . .	1 à 2 »		siana . . .	3 à 10 »	
Thomasii . . .	1 »		undulatum . . .	1 »	
triumphans . . .	1 50		<b>Brunia</b> imbricata (Wendl.) . . .	1 à 2 »	
variegata . . .	3 »		nodiflora . . .	1 à 2 »	
Wandesii . . .	1 »		<b>Brunswigia</b> Josephina (Ker.) . . .	5 »	
Wardii . . .	1 à 2 »		<b>Bumelia</b> tenax . . .	1 »	
Youngii . . .	1 à 2 »		<b>Burchellia</b> capensis (R. Br.) . . .	1 à 3 »	



	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
<b>CALCEOLARIA.</b> <i>Une collection de 12 belles variétés à mon choix. Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl . . . . .</i>		9	»
<i>Une collection de 12 variétés de second choix. Eine Sammlung von 12 Sorten, zweite Auswahl. . . . .</i>		6	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
<b>Callistachys</b> Drummondi . . . . .		5	»
<b>Calothamnus</b> Baxteri . . . . .		3	»
longissima (Hort.) . . . . .		2	»
quadrifida (R. Br.) . . . . .		1	»
Shoenophylla nova spec. . . . .		3	»
villosa (R. Br.) . . . . .		1	50
species nova Swanriver . . . . .		10	»

## CAMELLIA.

*J'accorde une remise de 10 p. % pour toute demande de Camellias dépassant 50 fr., et 15 p. % pour celles dépassant 100 fr.*

<i>J'offre en outre, à mon choix, 12 variétés de Camellias greffés de 2 ans, avec boutons . . . . .</i>	24	»
<i>12 variétés à mon choix, sans boutons . . . . .</i>	18	»
<i>50 variétés de Camellias greffés d'un an . . . . .</i>	60	»
<i>40 variétés de Camellias greffés de 2 ans . . . . .</i>	70	»
<i>Idem, 80 variétés . . . . .</i>	210	»
<i>100 pièces en 50 variétés doubles avec noms, sans boutons. . . . .</i>	150	»
<i>Camellias simples pour la greffe, de la force d'un tuyau de plume, le 100 . . . . .</i>	40	»
<i>Idem, plus forts, le 100 . . . . .</i>	70	»

Ich erlasse 10 p. % auf jede Camellia-Bestellung über 50 Fr., und 15 p. % auf die über 100 Fr. belaufend.

Ferner nach meiner Wahl :

<i>12 Sorten 2jährig gezweigter mit Knospen. . . . .</i>	24	»
<i>12 der nemlichen ohne Knospen . . . . .</i>	18	»
<i>50 Stück in 50 Sorten, jährige Veredlung . . . . .</i>	60	»
<i>40 Stück in 40 Sorten, 2jährige Veredlung . . . . .</i>	70	»
<i>80 Stück in 80 Sorten, 2jährige Veredlung . . . . .</i>	210	»
<i>100 Stück in 50 Sorten ohne Knospen . . . . .</i>	150	»
<i>100 Einfache Camellia zu Unterlagen . . . . .</i>	40	»
<i>100 derselben, stärkere . . . . .</i>	70	»

### CAMELLIA PYRAMIDES.

<i>12 pièces de 3 à 5 pieds de hauteur, en bonnes variétés . . . . .</i>	50	»
<i>12 pièces de 6 à 8 pieds de hauteur . . . . .</i>	200	»

*Je possède en outre de belles pyramides et hautes tiges, pour le prix desquelles on s'entendra par correspondance avec les amateurs.*

### CAMELLIA PYRAMIDEN.

<i>12 Stück von 3 bis 5 Fuss Höhe in guten Sorten. . . . .</i>	50	»
<i>12 Stück von 6 bis 8 Fuss Höhe . . . . .</i>	200	»

Ausser diesen besitze ich noch schöne Pyramiden und Hochstämme über deren

Preisse ich mich schriftlich mit den Hrn. Liebhaber verstehen werde.

*Ceux marqués d'un \* peuvent être fournis en pyramides, et ceux marqués d'une † comme hautes-tiges.*

Die mit \* bezeichnet können als Pyramiden, und die mit † als Hochstämme abgegeben werden.

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
<b>Camellia</b> axillaris (A. B.) . . . . .		1, 50	à 3
Eurioides rosea . . . . .		1	à 3 »
japonica alba fenestralis . . . . .		1	50
alba plena (A. B.) . . . . .		1	à 3 »
alba lutescens (A. B.) . . . . .		1	3 »
Æggeri . . . . .		3	6 »
* Alexandre-le-Grand . . . . .		2	6 »
* althœflora . . . . .		1	3 »
* Aminta . . . . .		»	10 »
* † anemoneflora rosea (A. B.) . . . . .		2	3 »
* striata . . . . .		2	3 »
* <b>Apollo</b> , nouvelle d'Italie . . . . .		1	5 »
* argentea plena . . . . .		2	4 »
atra Warratah nova . . . . .		2	4 »
* aurantiaca nova . . . . .		2	4 »
* Baggroni . . . . .		3	4 »
Baumanniana (A. B.) . . . . .		2	3 »
* Beali Palmers, Bealii, Lecana superbe . . . . .		3	4 »
* Bethforthii (Whithini) . . . . .		2	4 »
Belle Nanette . . . . .		2	4 »
Bellina . . . . .		»	3 »
Berleziana (A. B.) . . . . .		»	3 »
Bianchi . . . . .		2	4 »
* Blaw . . . . .		1	4 »
* Brooklyniana d'Amérique . . . . .		3	8 »
* <b>Calciali</b> , nouvelle d'Italie . . . . .		2	10 »
* <b>Campomolentina</b> . . . . .		2	20 »
candidissima . . . . .		2	3 »
† Candolli . . . . .		2	10 »
† <b>Canova</b> . . . . .		2	6 »
† * Caraccioli (F. B.) . . . . .		3	4 »
† Carlvelliana . . . . .		2	4 »
Chandleri (A. B.) . . . . .		2	5 »
Charles-Auguste . . . . .		2	3 »
Charlemagne . . . . .		»	3 »
China (A. B.) . Reves nova . . . . .		2	3 »
Cliveana (A. B.) . . . . .		2	5 »
colorata . . . . .		2	4 »
Columbo . . . . .		2	5 »



	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* <b>Camellia japonica compacta</b> . . . . .	4 »	
conspicua . . . . .	1, 50 à 3	
coronata . . . . .	2 »	
coronatissima . . . . .	2 à 3 »	
cruciata . . . . .	» 6 »	
* Dallenii . . . . .	2 5 »	
*† <b>Dario</b> . . . . .	4 10 »	
* decora . . . . .	2 5 »	
* <b>Delairi</b> ( <i>Aug. et Nap. Baumann</i> ), variété très-double, obtenue de graines, premier choix . . . . .	10 à 20	
* delicatissima . . . . .	2 à 4 »	
Delphino (Sada) . . . . .	5 »	
Diana . . . . .	2 à 4 »	
Diva Maria . . . . .	5 »	
*† Donckelari (A. B.) . . . . .	1, 50 à 3	
Dorsetti . . . . .	1 50	
Drummondi . . . . .	2 à 4 »	
Duchezza Litta . . . . .	3 7 »	
* Duchesse de Nemours . . . . .	» 2 »	
* Dunlap's americana . . . . .	» 6 »	
Dux Litta . . . . .	3 10 »	
Eclipse ou Pressi, Prestons Eclipse (Regina Gallorum) . . . . .	2 3 »	
* elegantissima (A. B.) . . . . .	2 4 »	
* Elisabeth impériale . . . . .	2 4 »	
* Elphinstonii (A. B.) . . . . .	2 3 »	
* Epsomiana . . . . .	» 2 »	
eximia vera (A. B.) . . . . .	2 4 »	
Feasti (M. Walters) . . . . .	3 20 »	
† fimbriata alba plena . . . . .	2 3 »	
* rubra . . . . .	4 9 »	
* flammea (A. B.) . . . . .	2 4 »	
* flammeola superba, voir <i>Elphinstoni</i> .		
*† flavescens (alba lutescens) . . . . .	2 4 »	
florida rosea . . . . .	2 4 »	
*† Floy. <i>Grand Frédéric</i> . . . . .	2 4 »	
* Fordii. <i>C. Devonensis</i> . . . . .	» 4 »	
* formosa (B. A.), <i>formosissima</i> . . . . .	2 4 »	
* Francofurtensis. <i>Wellingtoni</i> . . . . .	2 3 »	
Futtung, Reawesi, Rezeanum . . . . .	2 4 »	
gallica alba (A. B.) . . . . .	2 4 »	
général Zughsi. <i>Varischi</i> . . . . .	6 8 »	
<b>Gerandoi</b> ( <i>Nap. Baumann</i> ) . . . . .	» 30 »	
* Ghittina . . . . .	3 5 »	
* gigantea (A. B.) . . . . .	2 3 »	
* Gelisi ( <i>Nancy Dawton</i> ) . . . . .	2 3 »	
* gloria mundi . . . . .	2 3 »	
* Gozzi . . . . .	2 8 »	
Grafton Lady. <i>Lady preciosa</i> . . . . .	1 50 à 3	
grandiflora foliace . . . . .	2 à 4 »	
* <b>Greissi</b> ( <i>Aug.-Nap. Baumann</i> ) . . . . .	1 10 »	
Grunelli . . . . .	2 3 »	
* Harrisoni, <i>blanc</i> . . . . .	» 3 »	
Haylocki (Lokar) . . . . .	2 3 »	
* heptangularis . . . . .	2 4 »	
* hexangularis . . . . .	2 3 »	
* Il Fauno . . . . .	» 5 »	
* imbricata (A. B.) . . . . .	2 3 »	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* <b>Camellia japonica albo pleno</b> (A. B.),		
triomphans albo, albo picta . . . . .	2 à 3 »	
* imbricata spiraliter . . . . .	3 5 »	
* imperialis . . . . .	» 3 »	
†* incarnata . . . . .	2 3 »	
involuta (myrtifolia) . . . . .	2 3 »	
* <b>Jahnii</b> ( <i>Aug. et Nap. Baumann</i> ) . . . . .	» 20 »	
Kings royale, Clussi (A. B.) . . . . .	» 3 »	
* Kookia . . . . .	2 4 »	
Lamberti . . . . .	» à 4 »	
lactea lactiflora . . . . .	» 3 »	
Leeana superba (A. B.) Sieboldti . . . . .	2 4 »	
Leopoldina . . . . .	» 4 »	
L'infanto . . . . .	» 4 »	
Loudon . . . . .	2 5 »	
* lucida (A. B.) . . . . .	2 4 »	
lutescens . . . . .	» 3 »	
Lussiana . . . . .	» 3 »	
* Macdonaldi . . . . .	» 4 »	
maliflora. Sassangua roseo plena, multiflora . . . . .	2 3 »	
* Manotti . . . . .	2 4 »	
Manzoni . . . . .	2 5 »	
Maometto . . . . .	3 4 »	
Maribrandi . . . . .	» 3 »	
* <b>Marie Padilla</b> , nouvelle d'Italie . . . . .	3 10 »	
* marmorata (A. B.) . . . . .	2 3 »	
Marshall Wilder's aurora (F. B.) . . . . .	2 3 »	
* Martha . . . . .	» 20 »	
† Melinetti . . . . .	» 2 »	
* Melissa . . . . .	» 3 »	
* Merilli . . . . .	» 3 »	
* Micantica . . . . .	» 4 »	
* mira . . . . .	2 3 »	
* Miss Gunnel . . . . .	6 30 »	
* Monti . . . . .	2 4 »	
* Montironi . . . . .	» 3 »	
* mutabilis, Traversi (A. B.) . . . . .	2 5 »	
* <b>Muziana</b> ( <i>Aug.-N. Baumann</i> ), nouveau de semis, superbe . . . . .	» 10 »	
myrtifolia (A. B.) . . . . .	1 50 à 3	
* Napoléon (de France) . . . . .	2 à 6 »	
* Nassiniana . . . . .	2 3 »	
* <b>Neippergense</b> (N. B.), nou- velle et magnifique fleur rose sau- monnée, maculée de blanc . . . . .	» 10 »	
* <b>Neoboracensis</b> , nouvelle d'A- mérique . . . . .	2 10 »	
* nobilissim (A. B.) Waddi (A. R.) . . . . .	2 3 »	
Norma . . . . .	» 8 »	
ochroleuca . . . . .	» 2 »	
* Oleifera latifolia . . . . .	» 2 »	
* Omboni . . . . .	» 4 »	
Orlando . . . . .	2 5 »	
* ornata (A. B.) . . . . .	2 3 »	
* Oudiniana . . . . .	2 5 »	
Ourselli . . . . .	2 10 »	
†* Oxoniensis (A. B.) . . . . .	2 3 »	
* pæoniflora rosea (A. B.) . . . . .	1 3 »	
Palladinus Hungaricus . . . . .	» 3 »	



	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* <b>Camellia japonica</b> Palladio (Sada) . . . . .	3	50
pallida nova . . . . .	1 à 4	»
Parmentieri nivea . . . . .	»	3 »
* Park's striped (Parksii) . . . . .	2	3 »
Partheniana . . . . .	»	4 »
* Pawhallow . . . . .	3	20 »
* Pawlikowski rosea . . . . .	2	3 »
Peregalli . . . . .	»	5 »
* Pénélope . . . . .	»	5 »
* <b>Percyvalli</b> , nouv. d'Amérique. . . . .	3	6 »
Pie IX . . . . .	»	10 »
* Presley's Victoria. <i>Queen Victoria</i> . . . . .	3	10 »
* pictorum roseum . . . . .	2	15 »
* Pierre . . . . .	»	5 »
* Pomponia alba . . . . .	1	3 »
* rosea . . . . .	1	3 »
<b>Pratomolentina</b> . . . . .	»	20 »
Preston Eclipse (A. B.) . . . . .	2	3 »
* Prince d'Orange . . . . .	2	5 »
* Princesse Amélie . . . . .	2	5 »
punctata major ( <i>invincible</i> ) . . . . .	9	3 »
rosea plena . . . . .	2	4 »
* Pyroleana . . . . .	2	8 »
* Queen Victoria . . . . .	5	10 »
* <b>Radaellii</b> . . . . .	6	10 »
Radians (Sada) . . . . .	»	4 »
Rambuteau (Madame) . . . . .	»	6 »
* Regina Gallorum . . . . .	2	3 »
* Regina (Kings) . . . . .	»	3 »
Reignieri . . . . .	2	4 »
* Revini . . . . .	2	3 »
* Riccardi . . . . .	»	5 »
Richardsoni (d'Amérique) . . . . .	»	5 »
* Rives nova (China) . . . . .	2	3 »
* Rose Agathe . . . . .	3	10 »
* rasæflora . . . . .	2	3 »
* Rosamunda . . . . .	2	5 »
rosea punctata . . . . .	»	3 »
* Rouvroy . . . . .	»	4 »
* rubicunda . . . . .	»	3 »
* plena (A. B.) . . . . .	2	3 »
rubra maxima . . . . .	»	2 »
* rubricaulis variegata . . . . .	1	4 »
† * Sacco Limatensis . . . . .	2	8 »
* <b>Sarah Frost</b> , d'Amérique . . . . .	»	10 »
* Scottiana . . . . .	2	3 »
† * sericea . . . . .	2	3 »
* Sieboldii (imbrica. tricol.) . . . . .	3	4 »
* Sinica . . . . .	»	3 »
* Smith's amabilis . . . . .	»	2 »
* grandiflora . . . . .	2	4 »
* Saint-George . . . . .	25	»
* Sweetiana (A. B.) . . . . .	2 à 5	»
* Taylori . . . . .	2	5 »
Theresiana (A. B.) . . . . .	2 à 5	»
Teutonia . . . . .	2	10 »
* Traversi mutabilis . . . . .	2	5 »
Triphosa lactea (F. B.) . . . . .	2	4 »
† triumphans . . . . .	2	4 »
* variegata chinensis . . . . .	2	6 »

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* <b>Camellia</b> jap. varieg. plena (A. B.) . . . . .	2 à 3	»
* venusta (A. B.) . . . . .	2	4 »
* verecunda . . . . .	4	10 »
* atroviolacea . . . . .	»	5 »
* Vesuvius . . . . .	»	3 »
† Victor Hugo . . . . .	»	7 »
* virginier . . . . .	2	6 »
Wardii . . . . .	2	3 »
* <b>Washingtoniana</b> , nouvelle d'Amérique . . . . .	2	15 »
* Watsoniana . . . . .	2	3 »
Welbanksiana heptangularis . . . . .	3	4 »
† * Woodsi (A. B.) . . . . .	3	6 »
* reticulata (Lindl.) . . . . .	3	6 »
Sassangua rosea plena . . . . .	2	3 »
* nepalensis . . . . .	»	4 »
* oleifera (Abel) . . . . .	2	3 »
* lalifolia . . . . .	2	3 »
Thea Bohea . . . . .	1	3 »
camellioides . . . . .	3	»
Sassangua . . . . .	3	»
viridis (Green Thea) . . . . .	2 à 4	»
<b>Campanula</b> Barkeri? . . . . .	»	50
laciniata (Lin.) . . . . .	»	50
verna . . . . .	»	50
<b>Candolea</b> cuneiformis (Labil.) . . . . .	»	75
Cunninghami . . . . .	1	»
<b>Castanospermum</b> australe (Cunn.) . . . . .	5	»
<b>Ceanothus</b> azureus (Desf.) . . . . .	1	»
divaricatus . . . . .	»	50
<b>Celastrus</b> edulis . . . . .	1	»
<b>Cestrum</b> grandiflorum (Hort.) . . . . .	1	»
roseum (H. B.) . . . . .	1	»
<b>Chamærostenum</b> polyanthum? . . . . .	»	50
<b>Chasmone</b> Andrewsiana (E. M.) . . . . .	1	»
<b>Chironia</b> Fischeri . . . . .	1	»
linoides (L.) . . . . .	1	»
trinervis (Lin.) . . . . .	1	»
<b>Chorizema</b> ilicifolium (Labill.) . . . . .	1	»
triangularis . . . . .	3	»
varium . . . . .	1	»
12 plantes florifères } . . . . .	6	»
12 blühbare Pflanzen } . . . . .	1	»
novum . . . . .	1	»
<b>CINERARIA.</b> Une collection de premier choix de 12 variétés bien assorties . . . . .	9	»
Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl in den besten Sorten . . . . .	9	»
Une collection de 12 de second choix . . . . .	5	»
Eine Sammlung von 12 Stück, zweiter Auswahl . . . . .	5	»
<b>Citrus</b> aurantiacum chin. longifol . . . . .	3	»
nobilis, Or. douce . . . . .	1 à 8	»
latifolia foliis variegatis . . . . .	1	50 à 2
longifolia variegatis . . . . .	1 à 2	»
lunatum (Ris.), Or. turc . . . . .	1	2 50
Marocco . . . . .	1	2 »
Otahitense (Ris.) . . . . .	1	3 »
12 plantes } . . . . .	9	»
12 Pflanzen } . . . . .		



	La pièce.	fr.	c.
<b>Citrus aurantiacum</b> Portugallo vanigla.	1 à 2 »		
Tangerin . . . . .	1 3 »		
Tipain . . . . .	1 3 »		
australis . . . . .	1 3 »		
Bergamia melarosa . . . . .	1 3 »		
bastardo . . . . .	1 3 »		
flore pleno . . . . .	2 »		
merveille d'Espagne . . . . .	1 5 à 3		
du Pérou . . . . .	1 50		
Bigaradia crispifolia. Bouquetier.	1 à 2 »		
Japonica . . . . .	1 3 »		
foliis aureo variegatis . . . . .	1 8 »		
hystrix (QC.) . . . . .	1 4 »		
Limetta Pomum Adami. Cedra des juifs	1 4 »		
scanellatone . . . . .	1 3 »		
Limonium balotinum (Ris.) . . . . .	» 2 »		
chinense . . . . .	1 3 »		
digitatum . . . . .	1 50 à 3		
dolce . . . . .	1 à 3 »		
foliis integris . . . . .	1 3 »		
grossa della Regina . . . . .	» 3 »		
longo puncto. <i>C. umbellicato</i> . . . . .	1 4 »		
moscardina . . . . .	2 »		
à suc noir . . . . .	2 »		
monstrosum . . . . .	1 à 3 »		
Peretto domingensis . . . . .	2 50		
Pompelmus Chadec. à feuilles velues	1 à 3 »		
de Portorico, nouvelle variété . . . . .	5 »		
rubescens . . . . .	1 à 4 »		
striatum, scanellatum . . . . .	1 à 3 »		
foliis variegatis . . . . .	3 »		
stricta <i>C. buxifolia</i> . . . . .	1 à 2 »		
trifoliata . . . . .	1 à 3 »		
Une collection de 25 variétés diverses à mon choix . . . . .	25 »		
Eine Sammlung von 25 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	25 »		
20 variétés en greffe de 2 ans, au choix des amateurs . . . . .	30 »		
20 Arten in 2jæhrigen Zweigen nach der Wahl der Liebhaber . . . . .	30 »		
<b>Cheirostemum</b> platanoides (H. et B.)	3 »		
<b>Clethra</b> arborea (Ait) . . . . .	1 »		
foliis variegatis . . . . .	1 50		
maderiensis . . . . .	1 »		
mexicana . . . . .	2 »		
<b>Clianthus</b> puniceus (Soland) . . . . .	1 à 3 »		
<b>Correa</b> alba (DC.) . . . . .	» 50		
25 jeunes plantes propres à la greffe	10 »		
Alexandrina . . . . .	1 »		
cerise . . . . .	1 »		
bicolor . . . . .	1 »		
Goodi . . . . .	» 75		
Grevillii . . . . .	1 »		
longifloro . . . . .	1 à 4 »		
Marie de Bourgogne . . . . .	3 »		
nec plus ultra . . . . .	6 »		
pyramidalis . . . . .	3 »		
rosea elegantissima . . . . .	3 »		
sulphurea . . . . .	3 »		

	La pièce.	fr.	c.
<b>Correa</b> quadrangularis . . . . .	50 c. à 4f.		
rosea multiflora . . . . .	1 50 à 4		
rubra major . . . . .	2 »		
rufa (Goertn.) . . . . .	» 50		
12 plantes pour la greffe, 12 Pflanzen als Unterlage . . . . .	6 »		
speciosa (And.) . . . . .	1 à 2 »		
speciosissima . . . . .	1 à 2 »		
Stockwelliana . . . . .	2 »		
tricolor . . . . .	4 »		
ventricosa . . . . .	1 50		
viridiflora (Andr.) . . . . .	1 »		
<b>Cratægus</b> glabra . . . . .	1 50		
serratifolia . . . . .	2 »		
nouvelle espèce à feuilles persistantes, très-grande et belle plante . . . . .	2 »		
<b>Crotallaria</b> elegans . . . . .	1 »		
<b>Cuphea</b> cordata . . . . .	1 à 2 »		
miniata . . . . .	» 50		
platicentra . . . . .	» 50		
purpurea . . . . .	» 75		
strigulosa . . . . .	» 50		
<b>Cussonia</b> spicata (Thunb.) . . . . .	2 »		
thyrsiflora (Thunb.) . . . . .	1 50		
<b>Cyclamen</b> africanum . . . . .	4 à 20 »		
intermedium . . . . .	1 »		
neapolitanum (Tin.) . . . . .	1 »		
persicum (Mill.) . . . . .	75 c à 1 f.		
<b>DACRIDIUM.</b> Voyez Conifères.			
<b>Dais</b> cotinifolia (L.) . . . . .	1 »		
<b>Damara.</b> Voyez Conifères.			
<b>Daphne</b> Aucklandi . . . . .	2 à 3 »		
Cneorum maximum . . . . .	1 à 1 50		
foliis variegatis . . . . .	1 50		
Delahayana . . . . .	2 »		
Fioni, Daphne Delphini . . . . .	1 à 3 »		
indica foliis variegatis . . . . .	1 à 2 »		
flore rubra . . . . .	3 »		
neapolitana (Lodd.) . . . . .	1 à 2 »		
odora (Thunb.) . . . . .	2 »		
pontica (Spr.) . . . . .	1 »		
<b>Dasyliirion</b> filiforme . . . . .	5 à 10 »		
angustifolium . . . . .	5 à 10 »		
latifolia nova . . . . .	40 »		
species du Mexique . . . . .	30 »		
<b>Datura</b> arborea (L.). <i>Brugmansia candida</i> (Pers.) . . . . .	1 à 6 »		
<b>Diosma</b> angustifolia (Hort.). <i>Coleonema pulchra</i> (Hook.) . . . . .	1 »		
cordata (Hort.) . . . . .	1 »		
dioica . . . . .	1 »		
formosa . . . . .	1 »		
fragrans . . . . .	1 »		
grandiflora . . . . .	1 »		
purpurea (Hort.) . . . . .	» 50		
umbellata (W.) . . . . .	1 »		
uniflora . . . . .	1 »		
<b>Diplolena</b> Dampierii . . . . .	1 à 3 »		
<b>Dodonea</b> pinnata (Sm.) . . . . .	1 à 2 »		
<b>Dombeya</b> Erythroxylon (Willd.) <i>Mel.</i>			



	La pièce.	fr. c.
<i>hania Erythroxylon</i> . . . . .	1 à 3 »	
<b>Doriantes</b> excelsa (R. R.), très-fort	10 à 25	
<b>Droemandra</b> floribunda . . . . .	» 50	
<b>Dryandra</b> floribunda (R. Br.) . . . . .	10 »	
<i>formosa</i> (R. Br.) . . . . .	10 »	
<i>longifolia</i> (R. Br.) . . . . .	10 »	
<i>nivea</i> (R. Br.) . . . . .	10 »	
<i>tenuifolia</i> (R. Br.) . . . . .	10 »	
<b>Dysophylla</b> stellata (Benth.) . . . . .	1 »	
<b>Elcodendron</b> orientale . . . . .	6 »	
<b>Elichrysum</b> argenteum (Th.) . . . . .	1 »	
<i>fulgidum</i> (Willd.) . . . . .	1 »	
<i>proliferum</i> . <i>Phaenocoma prolifera</i> (D.)	1 à 3 »	
<i>spectabile</i> . . . . .	1 »	
<b>Embothrium</b> speciosissimum . . . . .	10 à 50	
<b>Embryopteris</b> glutinifera (Aou.) <i>Dios-</i>		
<i>pyros Embryopteris</i> (Spreng.) . . . . .	3 à 5 »	
<b>Enkianthus</b> longifolius . . . . .	8 à 10	
<i>quinqueflorus</i> (Lour.) . . . . .	5 à 12	
<b>Epacris</b> amabilis . . . . .	5 »	
<i>campanulata</i> (Lodd.) . . . . .	1 à 6 »	
<i>alba</i> . . . . .	4 »	
<i>carminibrata</i> . . . . .	1 à 3 »	
<i>coccinea</i> . . . . .	8 »	
<i>diosmæfolia</i> . . . . .	3 »	
<i>elegans</i> . . . . .	5 à 8 »	
<i>formosa</i> . . . . .	5 »	
<i>heteronema</i> (Labill.) . . . . .	1 »	
<i>grandiflora</i> (Sm.) . . . . .	1 à 4 »	
<i>hyacinthiflora</i> . . . . .	6 »	
<i>impressa</i> (Labill.) . . . . .	2 à 3 »	
<i>lævigata</i> . . . . .	5 »	
<i>nivalis</i> (Grah.) . . . . .	3 à 4 »	
<i>onosmæflora</i> (Cun.) <i>Lysineme rusci-</i>		
<i>folia</i> (Sieb.) . . . . .	1 à 5 »	
<i>pulchella</i> (Sieb.) . . . . .	3 »	
<i>major</i> . . . . .	2 »	
<i>variabilis</i> (Lodd.) . . . . .	4 »	
<b>Erica</b> amoena (Wendl.) incarnata . . . . .	1 50	
<i>Andromedoflora</i> , <i>petit</i> . . . . .	1 »	
<i>arborea</i> (L.) . . . . .	1 »	
<i>Australis</i> (L.) . . . . .	1 50	
<i>Banksii purpurera</i> . . . . .	2 »	
<i>blanda</i> . . . . .	2 »	
<i>Calycina</i> (L.) . . . . .	1 »	
<i>cerinthoides</i> (L.) . . . . .	3 »	
<i>colorans</i> (Andr.) . . . . .	2 »	
<i>concinna</i> (Ait.) . . . . .	1 »	
<i>concolor</i> (Lood.) . . . . .	1 »	
<i>corsica</i> . . . . .	1 »	
<i>costata superba</i> . . . . .	1 »	
<i>cubica minor</i> (B.) . . . . .	1 »	
<i>cupressina</i> . . . . .	1 »	
<i>cylindrica superba</i> (Hoffm.) . . . . .	2 »	
<i>equatiformis</i> ? <i>comme persoluta rubra</i> .	1 »	
<i>exigua</i> (Salisb.) . . . . .	1 »	
<i>exudans</i> (Andr.) . . . . .	1 »	
<i>glandinosa</i> ? . . . . .	1 »	
<i>glutinosa</i> . . . . .	1 50	
<i>Hibbertia</i> (Andr.) . . . . .	1 50	

	La pièce.	fr. c.
<b>Erica</b> hybernica var. <i>Mediterranea</i> . . . . .	1 50	
<i>hyemalis</i> . . . . .	1 à 2 »	
<i>ignescens</i> (Andr.) . . . . .	1 à 2 »	
<i>laniflora</i> (Wendl.) . . . . .	1 50	
<i>Linnea varietas</i> . . . . .	1 50	
<i>Linneoides</i> . . . . .	2 »	
<i>nova</i> . . . . .	2 50	
<i>longipes</i> . . . . .	1 à 2 »	
<i>mammosa</i> (L.) . . . . .	1 à 2 »	
<i>coccinea</i> . . . . .	2 »	
<i>major</i> . . . . .	1 »	
<i>mediterranea</i> (L.) . . . . .	1 »	
<i>montana</i> (Bedf. E.) <i>fabrilis</i> (Salisb.) . . . . .	1 »	
<i>multiflora orata</i> . . . . .	1 »	
<i>multiflorum anglorum</i> (Hort.) . . . . .	1 »	
<i>oppositifolia</i> (A. H.) . . . . .	1 »	
<i>passerina</i> (L.) . . . . .	1 »	
<i>persoluta alba</i> (L.) . . . . .	1 50	
<i>rubra</i> . . . . .		
<i>Pluckneti</i> . . . . .	1 »	
<i>polytrichifolia</i> (Salisb.) . . . . .	» 50	
<i>præstans</i> (Andr.) . . . . .	1 »	
<i>pubescens major</i> . . . . .	1 »	
<i>pulchella</i> (Andr.) . . . . .	1 »	
<i>pyrolæflora</i> . . . . .	1 50	
<i>regerminans</i> (L.) . . . . .	» 50	
<i>rubens</i> (Andr.) . . . . .	1 50	
<i>speciosa</i> (Andr.) . . . . .	2 »	
<i>suaveolens</i> . . . . .	2 »	
<i>sulphurea</i> . . . . .	2 »	
<i>tenella</i> . . . . .	1 »	
<i>Tetralix speciosa</i> (Hort.) . . . . .	1 »	
<i>translucens rubra</i> . . . . .	3 »	
<i>ventricosa</i> (Th.) . . . . .	1 »	
<i>globosa</i> . . . . .	2 »	
<i>porcellana</i> . . . . .	2 »	
<i>purpurea</i> . . . . .	1 »	
<i>stellata</i> . . . . .	1 50	
<i>verticillata</i> . . . . .	3 »	
<i>vestita</i> . . . . .	4 »	
<i>Une collection de 25 espèces à mon choix.</i>		
<i>Eine Sammlung von 25 Sorten, nach</i>		
<i>meiner Wahl</i> . . . . .		
	12 »	
<b>Eucomis</b> nana . . . . .	3 »	
<b>Eutaxia</b> Baxteri (K. et W.) . . . . .	1 50	
<i>myrtifolia</i> (R. Br.) . . . . .	1 50	
<b>Excoccaria</b> tinifolia (Swartz.) . . . . .	1 50	
<b>Fabiana</b> imbricata (R. P.) . . . . .	1 25	
<b>Fabricia</b> lævigata (Sm.) . . . . .	1 50	

## FUCHSIA.

<i>Amata</i> . . . . .	» 50
<i>Armide</i> . . . . .	1 »
<i>Aurantiaca</i> . . . . .	1 »
<i>carnea</i> . . . . .	» 50
<i>Carlii</i> . . . . .	1 »
<i>cerasifolia</i> . . . . .	1 »
<i>Chinois</i> . . . . .	» 50
<i>Clara</i> . . . . .	» 50



	La pièce.	fr. c.
<b>Fuchsia</b> Corelline . . . . .	1	»
cormarki . . . . .	»	75
Cursel . . . . .	1	»
coronet . . . . .	»	55
corymbiflora (R. B.) . . . . .	75 c. à 3 f.	
défiance . . . . .	»	50
Dezemii (Baumann), <i>belle fleur très-grande</i> . . . . .	1	»
Doctor Jephson . . . . .	1	50
Duchesse of Sutherland . . . . .	1	»
Emperor (Harrisson) . . . . .	1	»
Esmeralda (Miellez) . . . . .	1	»
Estella . . . . .	1	»
Fanny Esler (Miellez) . . . . .	1	»
Fairy Rosamunda (Harrisson) . . . . .	1	»
formosissima . . . . .	1	»
fulgens (R.) . . . . .	50 c. à 3	
Gabrielle d'Estrée . . . . .	1	50
Joan of Arc (Miellez) . . . . .	1	»
Juno . . . . .	»	50
Lanei . . . . .	1	»
macrantha . . . . .	2	»
magnet (Regel's) . . . . .	2	»
Napoléon (Miellez) . . . . .	»	50
nobilissima . . . . .	»	75
Prima donna . . . . .	»	50
nymphe . . . . .	1	»
Prince of Wales . . . . .	1	»
Queen Victoria . . . . .	1	50
racemiflora . . . . .	1	»
recurva . . . . .	»	50
Rebecca . . . . .	1	»
Robert . . . . .	»	50
Rogersiana . . . . .	»	50
Rosa mundi . . . . .	1	»
scaramouche . . . . .	»	50
Smith's White . . . . .	»	50
Splendendissima . . . . .	»	75
triumphans . . . . .	»	50
Venus victrix . . . . .	1	»

*J'offre en outre, à mon choix :*

Une collection de <b>Fuchsia</b> de 12 esp.	6	»
» » de 24 »	15	»
» » de 30 »	20	»

*Mehr nach meiner Wahl.*

Eine Sammlung von 12 Sorten . . . . .	6	»
» 24 » . . . . .	15	»
» 30 » . . . . .	20	»

*Au choix des amateurs :*

12 espèces . . . . .	15	»
24 » . . . . .	30	»

*Nach der Wahl der Liebhaber :*

12 Sorten . . . . .	15	»
24 » . . . . .	20	»
<b>Gardoquia</b> betonicoides . . . . .	1	»
Hookeri (Benth.) . . . . .	1	»
<b>Gastrolobium</b> vimineum . . . . .	1	»
<b>Gaultheria</b> mexicana? . . . . .	5	»

## GERANIUM OU PELARGONIUM.

NB. Variétés tirées des meilleures sources pour ce beau genre et offrant toutes les fleurs du premier ordre.

Varietäten von den besten Züchtler.

Une collection de 25 sortes. Eine Sammlung von 25 Sorten . . . . .

<b>Gordonia</b> Lasianthus L. . . . .	2	»
<b>Grevillea</b> acanthifolia (Sieb.) . . . . .	2	»
Baueri (R. B.) pubescens (Hook.) . . . . .	1	»
bipinnatifida . . . . .	6	»
ferruginea (Sieb.) . . . . .	1	50
Lawrenceana . . . . .	2	»
Manglesii (Hort.). <i>Manglesia cuneata</i> (Endl.) . . . . .	1	»
robusta (Cunn.) . . . . .	2 à 3	»
rosmarinifolia (Cunn.) . . . . .	1	»
sericea . . . . .	5	»
sulphurea (Cunn.) . . . . .	1	»
Thelemaniana (Hug.) . . . . .	1	50
vestita . . . . .	3	»
<b>Hakea</b> Baxteri (R. Br.) . . . . .	1	50
ceratophylla (R. Br.) . . . . .	1	50
flexilis (R. Br.) . . . . .	2	»
Lambertii (Sweet.) . . . . .	1	50
palmata . . . . .	2	»
pugioniformis (Cav.) . . . . .	1	50
species de Swan River . . . . .	15	»
<b>Hovea</b> pungens . . . . .	3 à 8	»
purpurea . . . . .	2 à 5	»
<b>Houstonia</b> coccinea (Andr.) . . . . .	1	»
<b>Hydrangea</b> Hortensis (DC.). Hortensia	1 à 4	»
moyenne force . . . . .	2	»
forte plante . . . . .	2	»
cœrulea . . . . .	1	50
forte plante . . . . .	5	»
japonica . . . . .	1 à 3	»
<b>Hydrolea</b> spinosa (Lin.), <i>aquatique</i> . . . . .	2 à 4	»
<b>Hypericum</b> japonicum (Thunb.) . . . . .	2	»
<b>ILEX</b> excelsa . . . . .	2 à 6	»
latifolia (Thunb.) . . . . .	2 à 8	»
<b>Illicium</b> anisatum (L.) . . . . .	1	50
floridanum (L.) . . . . .	1	50
religiosum . . . . .	2 à 3	»
<b>Isopogon</b> formosus . . . . .	2	»
<b>Isotoma</b> axillaris (R. Br.) . . . . .	1	»
<b>Jasminum</b> azoricum (L.) . . . . .	1	»
grandiflorum (L.) . . . . .	1	»
heterophyllum (Wall.) . . . . .	1	»
nepalense (Spr.) . . . . .	1	»
odoratissimum (L.) . . . . .	1	»
Wallichianum (Lindl.) . . . . .	1	50
<b>Lambertia</b> echinata (R. Br.) . . . . .	2 à 4	»
formosa (Sm.) . . . . .	1	50 à 3
<b>Laurus</b> camphora (L.) . . . . .	2 à 4	»
caroliniensis (Mich.) . . . . .	1	50
foetens (Ait.) . . . . .	2	»



	La pièce.	fr.	e.
<b>Laurus</b> glaucophylla? . . . . .		2	»
indica (Linn.) . . . . .		3	»
involucrata (Heb.) . . . . .		2	»
nobilis (L.) . . . . .		1 à 2	»
salicifolia . . . . .		2	»
foliis variegatis . . . . .		2	»
tomentosa . . . . .		2	»
<b>Leschenaultia</b> biloba . . . . .		» 50	
multiflora . . . . .		1	»
drumondi . . . . .		1	»
formosa (R. Br.) . . . . .		» 75	
laricifolia . . . . .		2	»
oblata . . . . .		1	»
splendens . . . . .		1 à 5	»
<b>Linaria</b> triornitophora . . . . .		1	50
<b>Lithospermum</b> rosmarinifolium (T.) . . . . .		» 50	
<b>Lobelia</b> Erinus (L.) . . . . .		1	»
Richardsonii . . . . .		1	»
Surinamensis . . . . .		1	50
<b>Lomatia</b> longifolia (R. Br.) . . . . .		1	50
silaifolia (R. Br.) . . . . .		3 à 6	»
<b>Magnolia</b> fuscata (Andr.) . . . . .		1 à 4	»
grandiflora (L.) . . . . .		2	50
12 jeunes plantes pour la greffe. 12			
junge Pflanzen als Unterlage . . . . .		7	50
Biquelin . . . . .		3	»
canaliculata . . . . .		2	»
Exmouth . . . . .		4	»
glabra ovata . . . . .		4	»
<b>HARTVIGUS</b> , hybride du pumila			
et grandiflora, nain et multiflore.		6	»
latifolia . . . . .		4	»
odoratissima <i>Talauma Candolli</i> . . . . .		»	»
oxoniensis . . . . .		2	»
præcox . . . . .		4	»
rotundifolia . . . . .		3	»
undulata . . . . .		2	»
pumila (Andr.) . . . . .		2 à 4	»
<b>Malva</b> lateritia . . . . .		3	»
<b>Manglesia</b> Drumondi . . . . .		1	50
<b>Melaleuca</b> calycina (R. Br.) . . . . .		1	»
decussata . . . . .		1	»
fulgens (R. Br.) . . . . .		1	»
ovata (Hort.) . . . . .		1	»
pulchella (R. Br.) . . . . .		1	»
species N° 2 Swanriver . . . . .		3	»
N° 3 » . . . . .		3	»
<b>Menispermum</b> laurifolium (Roxb.) . . . . .			
<i>Cocculus laurifolius</i> (DC.) . . . . .		1	»
<b>Mespilus</b> japonica (Willd.) . . . . .		1 à 2	»
<b>Metrosideros</b> præcox . . . . .		1 à 3	»
ruscifolia . . . . .		1	»
semperflorens (Lod.) . . . . .		1	»
<b>Mimulus</b> guttatus fulgens . . . . .		1	»
eximius . . . . .		1	50
Thompsoniana . . . . .		»	»
<b>Mirbelia</b> ilicifolia. <i>M. undulata</i> . . . . .		1 à 6	»
<b>Monsonia</b> filia? . . . . .		1	»
lobata (Ait.) . . . . .		» 75	
speciosa . . . . .		1	»

	La pièce.	fr.	e.
<b>Moræa</b> iridoides (L.). <i>Iris moræoides</i>			
(Ker.) . . . . .		1	»
<b>Myrtus</b> bullata (Salisb.) . . . . .		2 à 10	»
communis (L.) . . . . .		1 à 8	»
foliis variegatis . . . . .		1 à 6	»
romana . . . . .		1 à 8	»
horizontalis (Vent.). <i>Eugenia disticha</i>		1 à 2	»
mucronata (Pers.) . . . . .		1	»
tarentina (Mill.) . . . . .		1	»
<b>Nerium</b> oleander (L.) . . . . .		1	»
flore albo pleno . . . . .		1	50
album niveum . . . . .		1	50
atropurpureum odoratissimum . . . . .		1	50
plenissimum . . . . .		3	»
aurantiacum . . . . .		2	»
coccineum . . . . .		2	»
cupreum . . . . .		2	»
Foncolombinum, <i>double blanc</i> . . . . .		2	»
formosissimum . . . . .		1	50
grandiflorum pleno . . . . .		1	50
Granzeum . . . . .		1	50
indica multiflorum . . . . .		1	50
Jeanne d'Arc . . . . .		1	50
lacteolum . . . . .		1	»
Lesieuri pleno . . . . .		2	»
Mabiri . . . . .		1	»
maculatum pleno . . . . .		1	»
nitidum . . . . .		1	50
pumilum <i>luteum</i> . . . . .		2	»
punctatum pleno . . . . .		2	»
purpureum pleno . . . . .		1	»
coccineum . . . . .		2	»
Quellenii flore pleno . . . . .		2	»
Richardsoni . . . . .		1	»
foliis variegatis . . . . .		3	»
tinctorium . . . . .		1	»
variegato pleno . . . . .		»	»
vittatum . . . . .		1	50
splendens flore pleno . . . . .		1	»
foliis variegatis . . . . .		2	50
<b>Nymphæa</b> cœrulea (W.) . . . . .		3	»
<b>Olea</b> europæa (W.) . . . . .		1	»
buxifolia . . . . .		1	»
fragrans (Thunb.) . . . . .		1	»
<b>Oxalis</b> crassicaulis . . . . .		1	»
reptatrix (Jacq.) . . . . .		»	50
rosea (Jacq.), floribunda (B. B.) . . . . .		»	50
pectinata (Jacq.) . . . . .		»	50
<b>Penstemon</b> primuloides, P. mexican.		»	50
<b>Petrophila</b> pedunculata (R. Br.) . . . . .		2	»
pulchella (R. Br.) . . . . .		3	»
<b>Petunia</b> Beauté du jour, <i>pourpre bril-</i>			
<i>lant</i> . . . . .		1	50
Don Carlos . . . . .		»	50
Général Bem . . . . .		»	50
Général Tom Pouce, <i>petite mignature</i>		1	»
Iphicrate . . . . .		1	»
Irène . . . . .		»	50
ma favorite, <i>blanc strié de pourpre</i>		1	1
maxima . . . . .		1	»



	<i>La pièce.</i>	fr. c.
<b>Petunia</b> Melpomène, pourpre brillant, gr. fl. . . . .	1	»
mon Henry, rose strié de blanc en œillet . . . . .	2	2
mignonne, blanc, centre strié . . . .	1	»
Princesse Léopoldine . . . . .	»	50
Souvenir de Champ de banc . . . . .	1	50
<b>Phlox</b> Drummondi (Hook.) . . . . .	1	»
Donkelari . . . . .	1	»
<b>Phormium</b> tenax (Forst.) . . . . .	1	50
<b>Photinia</b> lævis. <i>Ph. lævigata</i> . . . .	1	50
serrulata (Lindl.) . . . . .	1	50
<b>Phylica</b> paniculata (Willd.) . . . . .	2	»
rosmarinifolia (Lam.). Soulangia axil- laris (Brong) . . . . .	1	»
<b>Phyllocladus.</b> <i>Voyez les Conifères,</i> <i>première partie.</i> — Sehe die Nadelhöl- zer im ersten Theil.		
<b>Physianthus</b> albens (Mart.). Arauja calycina (DC.) . . . . .	2	»
<b>Pimelea</b> drupacea (Labill.) . . . . .	»	50
decussata rubra . . . . .	1	»
hypericina (Hook.) . . . . .	1	»
mirabilis . . . . .	3	»
nivea (Babill.) . . . . .	2	»
spectabilis . . . . .	1	50 à 4
sylvestris (R. Br.) . . . . .	2	»
<b>PINCKNEYA</b> pubens (Pers.) . . . . .	5	»
<b>Pinus.</b> <i>Voyez les Conifères, première</i> <i>partie.</i> — Sehe die Nadelhölzer im er- sten Theil.		
<b>Pittosporum</b> discolor ? . . . . .	1	50
revolutum . . . . .	2 à 3	»
sinense (Desf.) . . . . .	1	»
Tobira (Ait.) . . . . .	1	»
foliis variegatis . . . . .	2	»
<b>Plumbago</b> Larpenste, <i>magnifique es-</i> <i>pèce rustique.</i> Prachtvolle und sehr harte Art. . . . .	1	»
<b>Podocarpus.</b> <i>Voyez les Conifères,</i> <i>première partie.</i> — Sehe die Nadel- hölzer, erster Theil.		
<b>Poinciana</b> Gillesi . . . . .	1 à 3	»
<b>Palygala</b> broboniæfolia (Burch.) . . .	2	»
cordifolia (Thunb.) . . . . .	1	»
Dalmaisia . . . . .	1 à 3	»
grandiflora (B. C.) . . . . .	1	50
Heisteria (L.). Muraltia (Heist.) . . .	1	»
latifolia (Br.) . . . . .	1	50
speciosa (Sims.) . . . . .	1	»
Zeyeri (Spreng.) . . . . .	2	»
<b>Porleria</b> hygrometrica (Ruiz. et Paw.)	»	50
<b>Primula</b> chinensis (Lour.) . . . . .	1	»
flore albo . . . . .	1	50
pleno . . . . .	2 à 6	»
rubro pleno . . . . .	5 à 10	»
Palinuri (R. B.) . . . . .	2	»
<b>Prostontheria</b> rotundifolia (R. Br.) .	1	50
violacea (R. Br.) . . . . .	»	50
<b>Protea</b> acaulis . . . . .	5	»

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
<b>Protea</b> adsendens. <i>Serruria adsendens.</i>	3	»
coccinea . . . . .	6	»
conferta . . . . .	3	»
cordata . . . . .	10	»
cynaroides . . . . .	4 à 8	»
grandiflora . . . . .	5	»
incompta (R. B.). <i>Leucodendron ovata</i>	2	»
insignis . . . . .	6	»
lepidocarpon . . . . .	5	»
mellifera . . . . .	3	»
nerifolia . . . . .	5	»
pallens (Linn.) . . . . .	2	»
pinifolia (L.). <i>Aulax pinifolia</i> (Berg.).	4	»
plumosa (Ait.) . . . . .	5	»
saligna (L.) . . . . .	3	50
scolymus . . . . .	»	»
speciosa rubra . . . . .	5	»
umbellata . . . . .	4	»
<b>Psorophytum</b> undulatum (Spach.) .	3	»
<b>Pultenæa</b> flaxilis (DC.) . . . . .	1	50
retusa (Sm.) . . . . .	1	50
subumbellata (Hook.) . . . . .	1	»
tenuifolia (R. Br.) . . . . .	1	»
<b>Punica</b> granatum (L.) . . . . .	1	»
sujete en tige . . . . .	6 à 10	»
lutea . . . . .	1 à 3	»
flore pleno . . . . .	2	»
sujets en tige . . . . .	5 à 25	»
nana . . . . .	1	50
prolifera . . . . .	1	50
<b>Quercus</b> glabra, du Mexique . . . .	10	»
rugosa (Nec.) . . . . .	3	»
<b>Rapiholepsis</b> salicifolia . . . . .	1	»
<b>Rhexia</b> elegans . . . . .	1	»

## RHODODENDRON

Arboreum . . . . .	2 à 8	»
arboreum album (Bot. Reg.) . . . .	3 à 4	»
augustum (M.) . . . . .	2 à 3	»
Burggravianum . . . . .	2	»
Chelsonii . . . . .	2 à 3	»
cinereum . . . . .	2	»
<b>Clito.</b> . . . . .	3	»
Cunninghami album . . . . .	3	»
cupreum . . . . .	2 à 3	»
diadematum . . . . .	2 à 3	»
Drummondi . . . . .	4	»
electum . . . . .	2 à 3	»
elegans . . . . .	2 à 3	»
<b>Forkelli</b> . . . . .	4 à 15	»
Grand-duc de Baden . . . . .	3	»
grandissimum . . . . .	4	»
Gronenbergense . . . . .	4	»
<b>Hæmmerlini</b> . . . . .	3 à 10	»
Impératrice Joséphine . . . . .	3 à 6	»
<b>Joshti.</b> . . . . .	3 à 15	»
Lady Warender (M.) . . . . .	3	»
Brougham . . . . .	3	»
macranthum . . . . .	2 à 5	»



	<i>La pièce.</i>	fr. c.
<b>Rhododendron</b> arbor. magniflorum.	2 »	
magnoliæfolium . . . . .	2 à 4 »	
<b>Marshal Wilder</b> . . . . .	4 »	
<b>Milleri</b> . . . . .	3 »	
<b>Muzianum</b> . . . . .	4 »	
niveum . . . . .	2 à 3 »	
Nobilianum . . . . .	3 »	
<b>Neumannii</b> (Nob.) . . . . .	3 à 10 »	
<b>Octavie Morel</b> (M.) . . . . .	8 »	
<b>Ottoi</b> . . . . .	10 »	
pallidum. Rh. Caraccioli (B.) . . . . .	2 à 4 »	
phœniceum . . . . .	2 »	
<b>Prince de Joinville</b> . . . . .	6 »	
pulchrum . . . . .	3 »	
<b>Queen Victoria</b> . . . . .	2 à 10 »	
<b>Rochetuilée</b> (Cam. de) . . . . .	3 »	
Roi des pourpres . . . . .	» »	
rubicaulis . . . . .	2 à 4 »	
rubrum pallidum . . . . .	2 à 5 »	
violaceum . . . . .	3 à 3 »	
rugosum (M.) . . . . .	4 »	
Russelianum . . . . .	3 »	
Smithii (M.) . . . . .	2 à 10 »	
album . . . . .	3 »	
elegans (M.) . . . . .	3 »	
Stephani (Grande Duchesse) . . . . .	4 »	
strictum . . . . .	4 »	
Triumphans (M.) . . . . .	3 »	
Triomphe d'Anvers . . . . .	3 »	
victory . . . . .	3 à 5 »	
Wiltoni . . . . .	3 »	
Altaclarens (Lindl.) . . . . .	2 à 5 »	
splendens . . . . .	» »	
campanulatum (Wall.) . . . . .	3 à 10 »	
Alexandrinum . . . . .	4 »	
latifolium . . . . .	4 »	
macrophyllum . . . . .	4 »	
speciosum . . . . .	4 »	
Cinnamomum . . . . .	» »	
Tarrerri, Rh. reticulatum . . . . .	4 »	
Gowenianum (B. F. G.) . . . . .	3 à 8 »	
Gibsoni . . . . .	2 à 10 »	
Norbertianum . . . . .	5 à 8 »	
Une collection de Rhododendron arbo- reum de 15 variétés à mon choix, greffés d'un an sans boutons . . . . .	15 »	
Eine Sammlung von 15 Sorten nach mei- ner Wahl, mit Namen, ohne Knospen. . . . .	15 »	
Une collection de 15 espèces et variétés à mon choix, greffés de deux ans. Forts, avec boutons . . . . .	30 »	
Eine Sammlung von 15 Sorten nach mei- ner Wahl, 2-jährige Zweige mit Knos- pen . . . . .	30 »	
Des individus forts, d'un à deux mètres. . . . .	4 à 25 »	
Starke Exemplare, von 1 bis 2 Meter Höhe . . . . .	4 à 25 »	
<b>Ribes</b> albidum . . . . .	1 50	
du Chili, nouveau . . . . .	1 »	
<b>Ruellia</b> azurea . . . . .	» 50	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
<b>Salvia</b> azurea (Lam.) . . . . .	1 »	
Camersoni . . . . .	» 75	
cardinalis (Humb.) . . . . .	» 50	
confertiflora . . . . .	2 »	
ericalix . . . . .	1 »	
Grabami (DS.) . . . . .	» 50	
patens (Cav.) . . . . .	1 »	
splendens (Ker.) . . . . .	1 »	
Species de Guatemala . . . . .	3 »	
tricolor var s. officinalis . . . . .	» 50	
<b>Scutellaria</b> splendens (Link.) . . . . .	1 »	
<b>Selago</b> Gillii (Bot. Reg.) . . . . .	1 50	
<b>Sempervivum</b> arboreum . . . . .	1 50	
<b>Sphænotoma</b> squarrosus . . . . .	3 à 10 »	
<b>Spigelia</b> nova ceylanica . . . . .	1 à 1 50	
<b>Statice</b> arborea (Brouss.) . . . . .	4 à 25 »	
Dicksonia . . . . .	3 à 5 »	
grandiflora (Hérit.) . . . . .	1 50	
monopetala (Linn.) . . . . .	1 50	
<b>Stevia</b> Lindleyana . . . . .	1 »	
<b>Styphelia</b> tubiflora (Smith.) . . . . .	3 »	
viridiflora . . . . .	1 »	
<b>Stylidium</b> adnatum (R. Br.) . . . . .	1 »	
androsaceum . . . . .	1 »	
fasciculatum (Lindl.) . . . . .	1 50	
<b>Swainsonia</b> coronillæfolia fl. rubra . . . . .	1 75	
<b>Taxus</b> . Voyez les Conifères, première partie. — Sehe die Nadelhoelzer im ersten Theil.		
<b>Templetonia</b> retusa (R. Br.) . . . . .	2 »	
glauca (Sims.) . . . . .	1 50	
species nova? . . . . .	10 »	
<b>Tetranema</b> mexicana. <i>Penstemon pri-</i> <i>muloides</i> . . . . .	» 50	
<b>Thea</b> camellioides . . . . .	3 »	
Bohea (Linn.) . . . . .	2 »	
Sassangua . . . . .	2 »	
viridis (Lin.) . . . . .	2 »	
<b>Thermopsis</b> laburnifolia (Don.) . . . . .	2 »	
<b>Torrenia</b> asiatica . . . . .	» 75	
<b>Tremandra</b> floribunda . . . . .	» 50	
<b>Tristania</b> laurina (R. Br.) . . . . .	2 »	
neriifolia (R. Br.) . . . . .	2 »	
<b>Ulex</b> hybernicus (DS.) . . . . .	1 »	
nana plena . . . . .	1 »	
nepalensis . . . . .	1 »	

## VERBENA

Adonis . . . . .	» 50
alba grandiflora . . . . .	1 »
Andromaque . . . . .	» 50
atropurpurea . . . . .	» 50
azureum grandiflorum . . . . .	» 75
Beauté suprême, rose superbe . . . . .	1 »
Browni . . . . .	» 50
Cardinal . . . . .	» 75
Comte de Paris, magnifique . . . . .	1 »
Coquetterie . . . . .	» 50
Curraiti (Baumann's), couleur plus vive	



	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
<i>que fine scarlet</i> . . . . .	2	»		<b>Verbena</b> Susanne. . . . .	»	50	
<b>Verbena</b> Delphine . . . . .	»	50		Triomphe de Zocher . . . . .	1	»	
Défiance. . . . .	»	50		Valentine de Savense . . . . .	»	75	
Diane . . . . .	»	50		Vicomte de Curval. . . . .	»	75	
Drumondi . . . . .	1	»		<i>Une collection de 20 Verbena bien assortis, à mon choix.</i> . . . . .	6	»	
Duchesse de Cazes . . . . .	»	75		Eine Sammlung von 20 schönen Sorten nach meiner Wahl. . . . .	6	»	
Duchesse d'Orléans, <i>rose, centre blanc superbe</i> . . . . .	1	»		<i>Une collection de 30 variétés à mon choix</i> . . . . .	10	»	
Emma Watson . . . . .	»	50		Eine Sammlung von 30 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	10	»	
Empereur du Maroc . . . . .	1	»		<b>Veronica</b> salicifolia. . . . .	2	»	
<i>fine scarlet.</i> . . . . .	»	75		<i>speciosa</i> . . . . .	1 à 1	50	
Geng (Monsieur). . . . .	»	50		<b>Viburnum</b> dentatum (L.) . . . . .	1	50	
Héloïse . . . . .	»	50		<i>japonicum</i> . . . . .	3	»	
Henri IV . . . . .	»	75		<i>odorantissimum</i> (Ker.) . . . . .	2	»	
Impératrice Joséphine, <i>bleu superbe</i> . . . . .	1	50		Tinus (W.) . . . . .	75 c. à 5f.		
John Salter. . . . .	»	75		<i>foliis variegatis</i> . . . . .	1 à 8	»	
Lamartine . . . . .	1	»		<b>Wachendorfia</b> thyrsiflora. . . . .	1	»	
La villageoise . . . . .	»	50		<b>Yucca</b> aloifolia (L.) . . . . .	4	»	
Léonora . . . . .	»	50		<i>foliis variegatis</i> . . . . .	4 à 40	»	
Mad. Buenzot. . . . .	»	50		<i>flaccida</i> (Haw) . . . . .	1	50	
Mad. de Passy . . . . .	»	50		<i>glaucescens</i> (Haw.) . . . . .	2	»	
Mad. Revenshon . . . . .	»	75		<i>gloriosa</i> (L.) . . . . .	2	»	
Marie . . . . .	1	»		<i>recurva</i> (Salisb.) . . . . .	3	»	
Marquis de Ridolfi. . . . .	»	75		<b>Zieria</b> trifoliata (Sm.) . . . . .	1	»	
Orpha. . . . .	»	75					
Rosalie . . . . .	»	75					
Sabinus . . . . .	»	75					

**Plantes à mon choix. — Pflanzen nach meiner Wahl.**

1° <i>Une collection de 50 plantes en 50 espèces, à mon choix. Eine Sammlung von 50 Sorten</i> . . . . .	20	»	<i>pèces. Eine Sammlung von 75 Sorten.</i> . . . . .	40	»
2° <i>Une collection de 75 plantes en 75 espèces.</i> . . . . .			3° <i>Une collection de 100 plantes en 100 espèces. Eine Sammlung von 100 Sorten</i> . . . . .	60	»

**PLANTES GRIMPANTES DE SERRE CHAUDE, TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.**

**Warm- und Kaltehaus-Spinnpflanzen.**

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
<i>Les espèces marquées d'un * sont pour serre chaude.</i>							
Die mit * bezeichnet sind für warme Häuser.							
<b>Acrophyllum</b> venosum . . . . .	3	»		* <b>Aristolochia</b> barbata (Jacq.) . . . . .	2	»	
* <b>Echynanthus</b> atropurpurea . . . . .	1	»		Gigas . . . . .	1	50	
Boschianus. . . . .	2	»		* <i>labiosa</i> (Ker.) . . . . .	2	»	
* <i>grandiflora</i> (Spr.). <i>Incarvillea parasi-</i>				* <i>saccata</i> . . . . .	1 à 4	»	
<i>tica</i> (Roxb.) . . . . .	1	50		<i>sempervirens</i> . . . . .	1	»	
* <i>Lobbianus</i> . . . . .	2	»		<b>Arum</b> auriculatum . . . . .	»	»	
* <i>Paxtoni</i> . . . . .	2	»		* <b>Asclepias</b> carnosa (L.) <i>Hoya carnosa</i>			
* <i>ramosissimus</i> . . . . .	1	»		(R. B.) . . . . .	1 à 2	»	
* <i>Roxburghii</i> . <i>A. macrophyllus</i> . . . . .	2	»		* <i>coccinea</i> . . . . .	2 à 3	»	
<b>Alstroemeria</b> acutifolia (M.) . . . . .	2	»		* <i>pendula</i> . . . . .	3	»	
<b>Argyrea</b> nervosa. . . . .	10	»		* <b>Banisteria</b> tenuis . . . . .	1	50	
				* <i>argentea</i> . . . . .	5	»	
				<b>Basella</b> tuberosa, <i>Bousingaultia bassel-</i>			
				<i>loides</i> . . . . .	»	50	
				<b>Batatas</b> betacea. <i>Ipomea Humboldtii</i> . . . . .	1	»	



	<i>La pièce.</i>	fr.	c.		<i>La pièce.</i>	fr.	c.
<b>Batatas</b> Wildenowi. . . . .	1	»		<b>* Jasminum</b> Azoricum . . . . .	1	»	
<b>Bauersia</b> maculata (M.). . . . .	2	»		grandiflorum . . . . .	1 à 3	»	
<b>* Beaumontia</b> grandiflora. . . . .	2	»		heterophyllum (Wall.) . . . . .	1 50		
<b>* Bauhinia</b> macrophylla (M.) . . . . .	10	»		nepalense (Spr.) . . . . .	1 50		
<b>Bignonia</b> capensis . . . . .	1	»		<b>* Sambac</b> fl. plena . . . . .	1 à 3	»	
capreolata (L.) . . . . .	1	»		Wallichianum (Lindl.) . . . . .	1 50		
heterophylla (W.). Kereri (Auhl.) . . . . .	2	»		<b>Kennedia</b> eximia? . . . . .	3	»	
jasminifolia (H. B.) . . . . .	1	»		Marryatiana (Lindl.) . . . . .	1	»	
Pandorana . . . . .	2	»		glabrata . . . . .	1	»	
speciosa . . . . .	1 à 2	»		<b>OBLONGATA</b> (Lem.). <i>Kennedy</i>			
<b>Bignonia</b> Twedeana . . . . .	1 à 2	»		<i>Baumannii</i> . . . . .	1	»	
<b>* venusta.</b> <i>Tecoma venusta</i> . . . . .	2	»		prostrata (R. B.). <i>Glycine coccin.</i> (C.)	1 50		
<b>* Bougainvillea</b> spectabilis (Willd.).	1 à 3	»		rubicunda (Vent.) . . . . .	1	»	
<b>* Brugmansia</b> floribunda. <i>Juvanuloa</i>				species de la nouvelle Hollande . . .	3	»	
<i>aurantiaca</i> . . . . .	2	»		splendens (Nob.) . . . . .	2	»	
<b>Cadsura</b> japonica (Van Sieb.). . . . .	1 50			spectabilis . . . . .	2	»	
<b>Cajophora</b> lateriata ( <i>Loasa</i> ) . . . . .	» 50			<b>Lathyrus</b> spec. de Boliva . . . . .	5	»	
<b>Candollea</b> Cunninghami (Hort.) . . . . .	2	»		<b>Lomalia</b> laurifolia . . . . .	2	»	
<b>* Ceropogia</b> elegans (Hook.) . . . . .	1	»		<b>Lonicera</b> japonica . . . . .	1	»	
<b>* africana</b> (R. B.) . . . . .	1	»		<b>Lophospermum</b> scandens (B. M.),			
<b>Chorizema</b> cordatum (Lindl.) . . . . .	1	»		<i>L. crubescens</i> (Don.) . . . . .	1	»	
illicifolium . . . . .	1	»		Hendersoni . . . . .	1 50		
rhombeum (R. Br.) . . . . .	» 75			atrosanguineum (Zucc.). <i>Rodochiton</i>			
spectabilis . . . . .	1	»		<i>volubile</i> (Zucc.) . . . . .	1	»	
<b>Clematis</b> florida (Th.), flore pleno. . . . .	2	»		<b>Mandevillea</b> suavelens . . . . .	1 à 3	»	
insulensis . . . . .	2 à 3	»		<b>* Manettia</b> bicolor . . . . .	1	»	
japonica (Thunb.) . . . . .	1 50			cordifolia (Mart.) . . . . .	1	»	
<b>Clerodendron</b> splendens (Hugel). . . . .	2 à 4	»		splendens . . . . .	3	»	
<b>Cobaea</b> scandens (Cav.) . . . . .	» 50			<b>Maurandia</b> Barckleyana (Tot. Mag.) .	» 50		
stipularis (Hort.) . . . . .	» 75			Gaulardii . . . . .	2	»	
<b>* Columnea</b> scandens. . . . .	1	»		Laccayana . . . . .	1	»	
<b>* Combretum</b> Afzeli (Don.) . . . . .	4 à 8	»		species de la Chine N° 1. . . . .	5	»	
<b>* macrophyllum</b> (Roxb.) . . . . .	6	»		» » N° 2. . . . .	6	»	
<b>* purpureum</b> . . . . .	3 à 8	»		<b>Medeola</b> asparagoides (L.). <i>Myrsiphyll-</i>			
<b>Dillenia</b> volubilis (Vent.). <i>Hibbertia</i>				<i>lum asparagoides</i> (Willd.) . . . . .	1 50		
<i>volubilis</i> (Andr.) . . . . .	2	»		<b>Micania</b> senceiodes . . . . .	1	»	
<b>Eccremocarpus</b> scaber (R. P.) . . . . .	1	»		<b>Mimosa</b> prostrata. . . . .	2	»	
<b>* Echites</b> purpurea . . . . .	1	»		<b>* Morinda</b> odorata? . . . . .	2	»	
picta . . . . .	1 à 5	»		<b>Oxylobium</b> cordifolium . . . . .	1 à 2	»	
<b>* Figus</b> repens (Roxb.) . . . . .	» 75			<b>Passiflora</b> amabilis. . . . .	2	»	
<b>* Gardenia</b> Scherbourniæ . . . . .	3	»		edulis (Sims.) . . . . .	1 50		
<b>* Gloriosa</b> superba (W.). . . . .	1 à 3	»		cœrulea (L.) . . . . .	1 50		
<b>Glycine</b> brachyphylla? <i>Brachybotrya</i> ?	2	»		<b>* Herbertiana</b> (Ker.) . . . . .	1 50		
chinensis coccinea . . . . .	3	»		<b>* Kermesina</b> (L. et O.) . . . . .	1	»	
<b>Hardenbergia</b> monophylla (Bth.) <i>Gly-</i>				<b>* Lemicheziana</b> . . . . .	1 50		
<i>cine bimaculata</i> (Hort.) . . . . .	1	»		<b>* linearis.</b> . . . . .	1 à 2	»	
Comptoniana (Bth.) . . . . .	1	»		longipedunculata? . . . . .	2	»	
macrophylla (Renth.) . . . . .	2	»		<b>* Loudonia</b> (Baum.) . . . . .	1	»	
ovata (Benth.) . . . . .	2	»		Mauritiniiana . . . . .	1 50		
<b>Hibertta</b> crenata (Andr.), <i>H. grossula-</i>				<b>* Neillii</b> . . . . .	1 50		
<i>riæfolia</i> (Satisb.) . . . . .	2	»		<b>* palmata</b> (Lodd.) . . . . .	»	»	
<b>* Ipomea</b> Horsfalliæ (Hook.) . . . . .	2 à 4	»		<b>* Princeps</b> (Lodd.) . . . . .	1 50		
Krusensterni (Ledeb) . . . . .	10	»		<b>* racemosa</b> . . . . .	1 50		
<b>* Leari</b> . . . . .	1 50			<b>* quadrangularis</b> (Linn.) . . . . .	2	»	
mexicana. . . . .	1	»		suberosa . . . . .	1	»	
rubra cœrulea. . . . .	1	»		<b>Phaseolus</b> Caracalla (Linn.) . . . . .	2	»	
Selloi . . . . .	1	»		<b>Philibertia</b> grandiflora . . . . .	1	»	
species de la Chine. . . . .	5	»		<b>Physianthus</b> undulatus (Hort.) . . .	2	»	
Schuttleworthii? <i>à feuilles palmées et</i>				<b>* Piper</b> magnoliæfolium . . . . .	2 50		
<i>fleurs en bouquets</i> . . . . .	10	»		<b>* nigrum</b> . . . . .	1 50		



	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
<b>Platilobium</b> triangulare (R. B.) . . .		1 50	<b>Thunbergia</b> Hawteynea (Wall.) . .		1 »
* <b>Pothos</b> undulata . . . . .		4 »	<b>Tropæolum</b> azureum . . . . .		4 à 6 »
* <b>Pteris</b> flexuosa . . . . .	2 à 3	»	crenatiflorum . . . . .		1.50 à 2f.
<b>Rhodochiton</b> volubile . . . . .		1 »	lobianum . . . . .		1 50
<b>Rosa</b> Banksiana alba plena . . . . .		2 »	minus (L.), flore pleno . . . . .		1 50
grandiflora alba plena . . . . .		2 »	pentapylum (Lam.) Chymocarpum		
lutea plena . . . . .		1 50	pentaphll. (Don.) . . . . .		» 75
pallida . . . . .		1 »	tricolorum (Sweet.) . . . . .		1 à 4 »
plena . . . . .		1 »	<b>Tweedia</b> coccinea . . . . .		1 50
Roi des Banks. . . . .		1 »	cœrulea (Sweet.) . . . . .		1 »
* <b>Rubus</b> japonicus . . . . .		2 »	<b>ZYCHIA BAUMANNI</b> (Lem.) . . .		2 »
molucanus (Linn.) . . . . .		2 »	floribunda . . . . .		3 »
<b>Seriana</b> velutina . . . . .		3 »	rotundifolia . . . . .		3 »
<b>Solanum</b> jasminiflorum . . . . .		1 50	<i>Une collection de 15 espèces, à mon</i>		
<b>Sollya</b> heterophylla (Lindl.) . . . .		1 50	<i>choix</i> . . . . .		10 »
salicifolia . . . . .		1 50	<i>Eine Sammlung von 15 Sorten nach mei-</i>		
* <b>Stigmatophyllum</b> aristatum (Liav.)		2 »	<i>ner Wahl</i> . . . . .		10 »
<b>Tamus</b> Elephantipes . . . . .	4 à 60	»	<i>Une collection de 20 espèces, à mon</i>		
<b>Thunbergia</b> alata . . . . .		1 »	<i>choix</i> . . . . .		20 »
aurantiaca . . . . .		1 »	<i>Eine Sammlung von 20 Sorten nach mei-</i>		
chrysops . . . . .	1 à 3	»	<i>ner Wahl</i> . . . . .		20 »
Freyeri . . . . .		1 »			

## OIGNONS ET FLEURS DISPONIBLES.

*Voyez le catalogue spécial de ces genres.*

*On peut se procurer toutes les nouveautés en Gladiolus, les Jacinthes de Hollande, Tulipes, Crocus, Lilium, Amaryllis, etc., etc., aux plus justes prix et premier choix.*

Man sehe für diese mein besonderes Verzeichniss.

Ich halte die meisten Neuheiten von Gladiolus, holländische Hiacinthen, Tulpen, Crocus, Lilien, Amarillis, Ixia, etc., etc., zu den billigsten Preisen und schönsten Auswahl.

## GRAINES.

<b>Graines de Giroflées d'Erfurth.</b>	fr. c.	<b>Graines de plantes vivaces de pleine terre.</b>	fr. c.
30 Variétés très-distinctes.		Une collection de 50 espèces, à mon choix . . . . .	10 »
<i>Le beau succès qu'ont obtenu les amateurs à qui j'ai fourni de ces graines les années précédentes, m'a engagé à les recommander spécialement; je les tire directement d'Erfurth.</i>		<b>Graines forestières.</b>	
Le paquet de 20 variétés assorties . . .	5 »	<b>Graines fourragères et de grandes culture.</b>	
<b>Graines de plantes annuelles d'ornement.</b>		<b>Graines de plantes de serre chaude et d'orangerie.</b>	
Une collection de 75 espèces et variétés, à mon choix . . . . .	10 »	Une collection de 50 espèces et variétés à mon choix . . . . .	10 »
Une collection de 50 espèces et variétés	8 »	<b>Graines d'arbres et d'arbustes d'ornement de pleine terre.</b>	
		Une collection de 50 espèces, à mon choix . . . . .	12 50



## TERRES DIVERSES.

*Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre, périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère : par conséquent, j'offre, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kil.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez moi de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.*

*Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher biete ich den doppelten Dekaliter (etwa 25 Kilog.) geruhter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei mir auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.*









### JARDINIERS.

Je me charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

### CONSTRUCTION DE JARDINS.

J'entreprends la plantation et les tracés de jardins, et tiens à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

---

### GÄRTNER.

Ich befasse mich unentgeltlich mit Besetzung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man mir die besondere Verwendung wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

### GARTEN-ANLAGEN.

Ich übernehme auch Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halte zu diesem Zwecke der Sache gewachsene Gärtner, zur Verfügung der Herren Eigenthümer.


---

Outre ces articles, on peut se procurer dans mon établissement des **arbres fruitiers, d'alignement, arbres et arbustes d'agrément, plantes potagères, plantes vivaces de pleine terre, graines de grande culture, potagères, etc.**, enfin tout ce qui a rapport à l'horticulture, outils, livres, etc. *Voyez le Catalogue N° 3. 1849.*

---

Ausser oben angegebenen Artikeln kann man bei mir in schöner Auswahl haben **Obst-, Allee- und Zierbäume; Gesträucher aller Art für's freie Land, perennirende Pflanzen, Küchenkräuter und Saamen aller Art.** *Man sehe den Catalogue N° 3. 1849.*







# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer